

**PENGENDALIAN PROSES VARIABILITAS MULTIVARIATE  
MELALUI VEKTOR VARIANSI**

**SAHABUDDIN S**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2013**

**PENGENDALIAN PROSES VARIABILITAS MULTIVARIATE  
MELALUI VEKTOR VARIANSI**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Matematika Terapan

Disusun dan diajukan oleh

SAHABUDDIN S

kepada

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2013

TESIS

PENGENDALIAN PROSES VARIABILITAS MULTIVARIATE MELALUI  
VEKTOR VARIANSI

Disusun dan diajukan oleh

SAHABUDDIN S

NIM. P3500209006

Telah diperiksa dan disetujui oleh penasehat  
untuk seminar hasil penelitian

Komisi Penasehat

**Dr. Erna Tri Herdiani, M.Si.**  
Ketua

**Dr. Eng.Armin Lawi, M.Eng.**  
Anggota

Mengetahui

Ketua Program Studi Matematika Terapan

**Prof. Dr. Syamsuddin Toaha, M.Sc.**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sahabuddin S

Nomor Mahasiswa : P3500209006

Program Studi : Matematika Terapan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang saya tulis benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar,  
Yang menyatakan

Sahabuddin S

## PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan karunianya, sehingga tesis dengan judul "PENGENDALIAN PROSES VARIABILITAS MULTIVARIATE MELALUI VEKTOR VARIANSI" dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis banyak menghadapi kendala, namun berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka tesis ini dapat selesai pada waktunya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Sp., BO selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Prof. Dr. Ir. Mursalim, M.Sc selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Prof. Dr. Syamsuddin Toaha, M.Sc selaku ketua Program Studi Matematika Terapan Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar sekaligus tim penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran yang sangat berarti untuk penyempurnaan tesis ini.
4. Dr. Erna Tri Herdiani, M.Si selaku Ketua Penasehat yang telah banyak membantu serta memberikan saran-saran dan bimbingan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Dr. Eng. Armin Lawi, M.Eng selaku anggota komisi penasehat dengan penuh kesabaran memberikan dorongan, bimbingan dan masukan yang sangat berarti bagi penulis.
6. Prof. Dr. Hj. Aidawaty Rangkuti, MS selaku tim penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran yang sangat berarti untuk penyempurnaan tesis ini.
7. Dr. Jeffry Kusuma selaku tim penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran yang sangat berarti untuk penyempurnaan tesis ini.

8. Seluruh Dosen pengajar Program Magister Matematika Terapan Universitas Hasanuddin Makassar yang telah membimbing dan memberikan bekal berupa penambahan wawasan serta ilmu pengetahuan.
9. Ayahanda Sumara Jaga dan ibunda tercinta Mujian Kenna yang tidak henti-hentinya memberikan semangat, kasih Sayang yang tak terhingga sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Istriku tercinta Asriani MS, A.Md.Keb. atas semangat dan dukungan serta doa yang tulus selama study hingga tesis ini dapat terselesaikan.
11. Sahabatku mahasiswa Program Magister Matematika Terapan Universitas Hasanuddin Makassar angkatan 2009 yang bersama-sama melewati masa kuliah di kampus tercinta. Kalian adalah teman terbaikku.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan secara tertulis dan telah membantu terlaksananya penyusunan tesis.

Menyadari tesis ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan. Dengan tangan terbuka penulis menerima segala kritikan dan saran demi kesempurnaan tesis ini, dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Makassar, 31 Juli 2013

Sahabuddin S

## ABSTRAK

**Sahabuddin.** Pengendalian Proses Variabilitas Multivariate Melalui Vektor Variansi (dibimbing oleh Erna Herdiani dan Armin Lawi).

Penelitian ini bertujuan (1) Melakukan pengkajian tentang Vektor Variansi (2) Melakukan pengkajian tentang Vektor Variansi dalam pengendalian variabilitas dalam proses multivariate. (3) Menggunakan hasil yang telah diperoleh dari a dan b pada data Sekunder dari Badan Meteorologi dan Geofisika Kota Semarang.

Jenis penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan literatur berupa buku dan jurnal yang relevan, Sumber data yang akan digunakan sebagai contoh pada penelitian merupakan data Sekunder dari Badan Meteorologi dan Geofisika Kota Semarang dengan melibatkan 4 variabel yakni Curah hujan ( $X_1$ ), Suhu Udara ( $X_2$ ), kelembaban udara ( $X_3$ ) dan kecepatan angin ( $X_4$ ).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengendalian variabilitas proses melalui Vektor Variansi dapat dinyatakan dalam bentuk  $Tr(\hat{\Sigma}^2) = (vec(\hat{\Sigma}))^t(vec(\hat{\Sigma}))$ , Selanjutnya pembentukan bagan kendali dapat ditentukan dengan menggunakan statistik vektor variansi tersebut. Analisis data cuaca di Semarang melalui statistik vektor variansi diketahui bahwa BKA :  $7,26 \cdot 10^8$ , BKB:  $-2,51 \cdot 10^8$  dan GT:  $2,37 \cdot 10^8$ .

## ABSTRACT

*The variability process control involved more than two process quality characteristics which were to each other called the variability control. The research aimed at conducting the variance vector in the variability control in the multivariate process. This was a library study research by collecting the literature in the forms of the relevant books and journals.*

*The data resources used as the samples in the research were the secondary data from the board of Meteorology and Geophysics of Semarang City by involving 4 variables i.e: rainfall ( $X_1$ ), temperature ( $X_2$ ), humidity ( $X_3$ ), wind velocity ( $X_4$ ).*

*The research result indicates that the process variability control through the variance vector can be stated in the of  $\text{Tr}(S)^2 = (\text{vec}(S))^t(\text{vec}(S))$ . Then the controlling chart formation is determine by using the variance vector statistics. The weather data analysis in Semarang through the variance vector statistics is found that BKA is:  $7,26 \cdot 10^8$ , BKB= $-2,57 \cdot 10^8$ , and GT=  $2,37 \cdot 10^8$ .*



## DAFTAR ISI

	<b>halaman</b>
Prakata	v
Abstrak	vii
Abstract	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xv
Daftar Arti Lambang dan Singkatan	xvi
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
E. Batasan Masalah	3
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>4</b>
A. Struktur Data Multivariate	4
B. Matriks Variansi Kovariansi	5

	C. Vektor variansi (VV)	8
	D. Penaksiran Parameter	1
	E. Pengendalian Proses Statistik Multivariate (MSPC) ..	13
	F. Beberapa Defenisi Dan Rumus – rumus Pendukung	14
BAB III	METODE PENELITIAN	22
	A. Sumber Data	22
	B. Variabel Yang Terlibat	22
	C. Prosedur Dan langkah-langkah Penentuan Bagan Kendali	23
	D. Alur Kerja	24
BAB IV	PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA	25
	A. Vektor Variansi	25
	B. Bagan Kendali Vektor Variansi	28
	C. Bagan Kendali Tr ( $S^2$ ) Pada Data Cuaca di Semarang	30
BAB V	Kesimpulan Dan Saran	38
	A. Kesimpulan	38
	B. Saran	39
	Daftar Pustaka	40
	LAMPIRAN	42

## DAFTAR TABEL

<b>nomor</b>	<b>halaman</b>
1. Matriks Kovariansi dari setiap sampel	31
2. Matriks Kovariansi rata-rata	32

## DAFTAR GAMBAR

<b>nomor</b>		<b>halaman</b>
1.	Grafik bagan kendali Vektor Variansi pada data pendahuluan	34
2.	Grafik bagan kendali vector variansi pada monitoring	37

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>nomor</b>	<b>halaman</b>
1. Data Sekunder Cuaca BMG Kota Semarang	39
2. Lampiran II. Data analisis melalui program maple 15	40

## DAFTAR ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN

Lambang/ singkatan	Arti dan Keterangan
URL	Uniform Resource Locator, adalah rangkaian karakter menurut suatu format standar tertentu, yang digunakan untuk menunjukkan alamat suatu sumber seperti dokumen dan gambar internet. Secara umum, URL adalah "alamat situs internet"
IP	Internet Protocol, adalah deretan angka biner yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer host dalam jaringan Internet
Proxy	Sebuah perantara (sistem komputer atau aplikasi) yang bertindak sebagai perantara permintaan dari pengguna (client) untuk mencari sumber daya dari server lain
DNS	DNS singkatan dari Domain Name Server. Server untuk kepentingan translasi hostname (nama komputer) menjadi IP adress
RFC	Request for Comments, adalah salah satu dari seri dokumen informasi dan standar Internet bernomor yang diikuti secara luas oleh perangkat lunak untuk digunakan dalam jaringan, Internet dan beberapa sistem operasi jaringan
NIC	Network Interface Card, berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer
SPAM	Spam atau junk mail adalah penyalahgunaan dalam pengiriman berita elektronik untuk menampilkan berita iklan dan keperluan lainnya yang mengakibatkan ketidaknyamanan bagi para pengguna web
HAM	Ham dalam istilah Internet berarti lawan dari spam
False Negatif	Keadaan ketika filter spam mengklasifikasikan website Spam sebagai Ham.
False Positif	Keadaan ketika filter spam mengklasifikasikan website Ham sebagai Spam

Sumber: Kamus Internet Online

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengendalian proses variabilitas merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam industri untuk meningkatkan kualitas proses produksi. Dalam prakteknya pengendalian proses menggunakan peta kendali.

Peta kendali berdasarkan variabel yang terlibat terbagi atas peta kendali satu variabel (univariat) dan peta kendali lebih dari satu variabel (multivariate), (Djauhari, dkk. 2010). Pengendalian proses multivariat merupakan salah satu bagian yang cepat berkembang karena ada banyak situasi real yang melibatkan lebih dari dua karakteristik kualitas proses yang saling berhubungan. Pengendalian proses multivariate ini selanjutnya dikenal sebagai *Multivariate Statistics Process Control* (MSPC).

Peta kendali Shewhart pada umumnya untuk pengendalian rata-rata proses dan variabilitas proses. Pada tesis ini penulis akan membahas tentang peta kendali untuk variabilitas proses. Pada pengendalian variabilitas proses berdasarkan satu variabel, praktisi banyak menggunakan peta kendali Standar Deviasi (SD) dan Range (R), sedangkan untuk kasus multivariate pengendalian variabilitas proses menggunakan peta kendali  $|S|$ , dimana S adalah matriks

variasi kovariansi sampel. Pada proses ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang  $Tr(S^2)$  yang digunakan untuk masalah statistik pengendalian proses multivariate, dimana  $Tr(S^2)$  pertama kali dikembangkan oleh Djauhari (2007).

Dengan demikian maka pada tesis ini akan dikaji tentang pembentukan peta kendali dari variabilitas proses melalui Statistik Vektor Variansi dan akan diaplikasikan pada data curah hujan, suhu udara, kelembaban udara dan kecepatan angin yang merupakan data sekunder BMG Semarang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai bagian dari sistematika penulisan sebagai berikut:

- a. Bagaimana mengkaji Vektor Variansi sebagai statistik dalam pengendalian variabilitas dari proses multivariate?
- b. Bagaimana mengaplikasikan hasil yang telah diperoleh pada data Sekunder dari Badan Meteorologi dan Geofisika Kota Semarang.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dalam penulisan tesis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengkajian tentang Vektor Variansi.



- b. Melakukan pengkajian tentang Vektor Variansi dalam pengendalian variabilitas dalam proses multivariate.
- c. Menggunakan hasil yang telah diperoleh dari a dan b pada data Sekunder dari Badan Meteorologi dan Geofisika Kota Semarang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

- a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan bahwa ternyata Vektor Variansi dapat digunakan dalam data cuaca dari BMG Kota Semarang.
- b. Sebagai referensi bagi pembaca untuk penelitian selanjutnya.

#### **E. Batasan Masalah**

- a. Penelitian dibatasi data yang memiliki asumsi yang berdistribusi normal multivariate dengan mengambil banyaknya variabel adalah 4 variabel
- b. Penelitian mengambil studi kasus pada data Sekunder dari Badan Meteorologi dan Geofisika Kota Semarang dari tahun 2001 sampai tahun 2005.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Struktur Data Multivariate

Sebuah observasi multivariate adalah koleksi pengukuran (collection of measurements) pada  $p$  peubah yang berbeda dalam suatu pengamatan yang sama. Jika  $N$  observasi sudah diperoleh pada setiap peubah ke  $i, i = 1, 2, \dots, p$  maka entri *data* dapat dinyatakan dalam bentuk matriks berukuran  $p \times N$ . Adapun struktur datanya adalah sebagai berikut :

	Item 1	...	Item $j$	...	Item $N$
Variabel 1	$x_{11}$	...	$x_{1j}$	...	$x_{1N}$
Variabel 2	$x_{21}$	...	$x_{2j}$	...	$x_{2N}$
⋮	⋮		⋮		⋮
Variabel $i$	$x_{i1}$	...	$x_{ij}$	...	$x_{iN}$
⋮	⋮		⋮		⋮
Variabel $p$	$x_{p1}$	...	$x_{pj}$	...	$x_{pN}$

Dimana :

$x_{ij}$  = menunjukkan nilai tertentu pada variabel ke  $i$  dan pengamatan ke  $j$ .

$i = 1, 2, \dots, p$  ,  $j = 1, 2, \dots, N$

$N$  = ukuran observasi yang diamati

Data ini dapat ditulis dalam susunan (*array*) persegi panjang yang disebut matriks  $\mathbf{X}$  berukuran  $p \times N$  ( $p$  baris dan  $N$  kolom), yaitu :

$$\mathbf{X}_{p \times N} = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1j} & \dots & x_{1N} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2j} & \dots & x_{2N} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ x_{i1} & x_{i2} & \dots & x_{ij} & \dots & x_{iN} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ x_{p1} & x_{p2} & \dots & x_{pj} & \dots & x_{pN} \end{bmatrix} \quad (2.1)$$

Matriks  $\mathbf{X}$  dapat dituliskan dalam bentuk vektor acak dengan  $p$  variabel sebagai berikut,

$$\vec{\mathbf{X}} = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_i \\ \vdots \\ X_p \end{bmatrix} \quad (2.2)$$

dimana pada setiap vektor  $X_i$ ,  $i = 1, 2, \dots, p$  dilakukan  $N$  pengukuran, dengan nilai-nilai pengukuran  $x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{iN}$ , (Rencher, 2002).

## B. Matriks Variansi Kovariansi

Matriks variansi-kovariansi biasa juga di singkat dengan nama matriks kovariansi, dan juga disebut matriks dispersi, (Rencher, 2002). Matriks kovariansi untuk data multivariate pada (2.1) dinyatakan sebagai :

$$\Sigma_{p \times p} = Cov(\mathbf{X}) = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \cdots & \sigma_{1p} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \cdots & \sigma_{2p} \\ \vdots & \cdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{p1} & \sigma_{p2} & \cdots & \sigma_{pp} \end{bmatrix} \quad (2.3)$$

dimana,

$$\sigma_{ij} = \frac{1}{N-1} \sum_{k=1}^N (x_{ik} - \mu_i)(x_{jk} - \mu_j), i, j = 1, 2, \dots, p \quad (2.4)$$

$\mu_i = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N x_{ik}$  yang merupakan mean populasi untuk variabel ke- $i$

$\mu_j = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N x_{jk}$  yang merupakan mean populasi untuk variabel ke- $j$

Elemen-elemen diagonal utama  $\sigma_{ii} = \sigma_i \sigma_i = \sigma_i^2$  adalah variansi populasi untuk variabel  $X_i$ , sedangkan elemen-elemen lainnya  $\sigma_{ij} = \sigma_i \sigma_j, i \neq j$  adalah kovariansi populasi antara variabel  $X_i$  dengan  $X_j$ . Matriks  $\Sigma_{p \times p}$  merupakan matriks simetri karena  $\sigma_{ij} = \sigma_{ji}, i, j = 1, 2, \dots, p$ .

Matriks variansi-kovariansi populasi pada persamaan (2.3) dapat pula dinyatakan dalam bentuk ekspektasi sebagai berikut :

$$\Sigma_{p \times p} = E[(\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu})(\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu})'] \quad (2.5)$$

$$= E \left[ \begin{pmatrix} X_1 - \mu_1 \\ X_2 - \mu_2 \\ \vdots \\ X_p - \mu_p \end{pmatrix} (X_1 - \mu_1 \quad X_2 - \mu_2 \quad \cdots \quad X_p - \mu_p) \right]$$

$$= \begin{bmatrix} E(X_1 - \mu_1)^2 & E(X_1 - \mu_1)(X_2 - \mu_2) & \cdots & E(X_1 - \mu_1)(X_p - \mu_p) \\ E(X_2 - \mu_2)(X_1 - \mu_1) & E(X_2 - \mu_2)^2 & \cdots & E(X_2 - \mu_2)(X_p - \mu_p) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ E(X_p - \mu_p)(X_1 - \mu_1) & E(X_p - \mu_p)(X_2 - \mu_2) & \cdots & E(X_p - \mu_p)^2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \cdots & \sigma_{1p} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \cdots & \sigma_{2p} \\ \vdots & \cdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{p1} & \sigma_{p2} & \cdots & \sigma_{pp} \end{bmatrix}$$

dimana  $E(X_i - \mu_i)(X_j - \mu_j) = \sigma_{ij}$

### Matriks Variansi-Kovariansi Sampel

Misalkan  $(X_1, X_2, \dots, X_N)$  merupakan vektor acak dari  $p$ -variate normal dengan parameter  $\mu$  dan  $\Sigma$ . Kemudian,  $\bar{X}$  sebagai statistik vektor *mean* sampel dan  $S$  sebagai sampel matriks variansi kovariansi sampel dinyatakan sebagai :

$$S = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})(X_i - \bar{X})^T \quad (2.6)$$

dimana

$$\bar{X} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n X_i, \text{ adalah vektor mean} \quad (2.7)$$

$\bar{X}_i$  : variabel ke- $i$ ,  $i = 1, 2, \dots, p$

$n$  : ukuran sampel

$S$  : matriks variansi kovariansi sampel

$p$  : jumlah variabel, (Anderson, T.W. 2003)

matriks variansi-kovariansi untuk sampel pada persamaan (2.6) dapat pula dituliskan sebagai

$$\mathbf{S}_{p \times p} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & \cdots & S_{1p} \\ S_{21} & S_{22} & \cdots & S_{2p} \\ \vdots & \cdots & \ddots & \vdots \\ S_{p1} & S_{p2} & \cdots & S_{pp} \end{bmatrix} \quad (2.8)$$

dengan

$$s_{ij} = \frac{1}{n-1} \sum_k^n (x_{ik} - \bar{x}_i)(x_{jk} - \bar{x}_j), i, j = 1, 2, \dots, p \quad (2.9)$$

### C. Vektor Variansi (VV)

Pandang  $\vec{\mathbf{X}}$  adalah vektor acak yang merupakan superposisi dari dua vektor acak  $\vec{\mathbf{X}}^{(1)}$  dan  $\vec{\mathbf{X}}^{(2)}$ , di mana masing-masing berdimensi  $p$  dan  $q$ , yang dapat dituliskan dalam bentuk partisi sebagai berikut:

$$\vec{\mathbf{X}}_{(p+q) \times 1} = \begin{bmatrix} \vec{\mathbf{X}}^{(1)} \\ \vec{\mathbf{X}}^{(2)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_1^{(1)} \\ X_2^{(1)} \\ \vdots \\ X_p^{(1)} \\ X_1^{(2)} \\ X_2^{(2)} \\ \vdots \\ X_q^{(2)} \end{bmatrix} \quad (2.10)$$

dengan vektor mean adalah

$$\vec{\mu}_{(p+q) \times 1} = E(\vec{X}) = E \begin{bmatrix} \vec{X}^{(1)} \\ \vec{X}^{(2)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E(\vec{X}^{(1)}) \\ E(\vec{X}^{(2)}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vec{\mu}^{(1)} \\ \vec{\mu}^{(2)} \end{bmatrix} \quad (2.11)$$

dan matriks variansi kovariansi adalah

$$\Sigma_{(p+q) \times (p+q)} = E(\vec{X} - \vec{\mu})(\vec{X} - \vec{\mu})^t \quad (2.12)$$

$$\begin{aligned} &= E \begin{bmatrix} (\vec{X}^{(1)} - \vec{\mu}^{(1)})(\vec{X}^{(1)} - \vec{\mu}^{(1)})^t & (\vec{X}^{(1)} - \vec{\mu}^{(1)})(\vec{X}^{(2)} - \vec{\mu}^{(2)})^t \\ (\vec{X}^{(2)} - \vec{\mu}^{(2)})(\vec{X}^{(1)} - \vec{\mu}^{(1)})^t & (\vec{X}^{(2)} - \vec{\mu}^{(2)})(\vec{X}^{(2)} - \vec{\mu}^{(2)})^t \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} E(\vec{X}^{(1)} - \vec{\mu}^{(1)})(\vec{X}^{(1)} - \vec{\mu}^{(1)})^t & E(\vec{X}^{(1)} - \vec{\mu}^{(1)})(\vec{X}^{(2)} - \vec{\mu}^{(2)})^t \\ E(\vec{X}^{(2)} - \vec{\mu}^{(2)})(\vec{X}^{(1)} - \vec{\mu}^{(1)})^t & E(\vec{X}^{(2)} - \vec{\mu}^{(2)})(\vec{X}^{(2)} - \vec{\mu}^{(2)})^t \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \Sigma_{11} & \Sigma_{12} \\ \Sigma_{21} & \Sigma_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Sigma_{11} & \Sigma_{12} \\ \Sigma_{21} & \Sigma_{22} \end{bmatrix} \quad (2.13) \end{aligned}$$

dengan  $\Sigma_{12} = \Sigma_{21}$  adalah merupakan semetri (Richard and Dean, 2002).

Untuk sampel, persamaan (2.13) menjadi

$$\mathbf{s} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} \quad (2.14)$$

Djauhari (2007) mengemukakan bahwa Cleroux (1987) menggunakan

$Tr \left[ \begin{matrix} \Sigma_{12} \\ \Sigma_{21} \end{matrix} \right]$  untuk mengukur hubungan linear antara dua vektor acak  $\vec{X}^{(1)}$  dan

$\vec{X}^{(2)}$ . Parameter ini merupakan Vektor Variansi yang merupakan jumlah semua elemen diagonal dari  $\Sigma_{12}\Sigma_{21}$ . Dengan demikian, seperti yang dikemukakan Djauhari (2007),  $Tr(\Sigma_{11}^2)$  dan  $Tr(\Sigma_{22}^2)$  secara berturut-turut disebut Vektor Variansi (VV) dari  $\vec{X}^{(1)}$  dan  $\vec{X}^{(2)}$ . Jika  $p = q = 1$ , Vektor Variansi adalah kuadrat dari kovariansi merupakan kuadrat dari variansi klasikal.

Jadi Vektor Variansi (VV) dari  $\vec{X}^{(1)}$  adalah

$$Tr(\Sigma_{11}\Sigma_{11}) = Tr(\Sigma_{11}^2)$$

dan Vektor Variansi (VV) dari  $\vec{X}^{(2)}$  adalah

$$Tr(\Sigma_{22}\Sigma_{22}) = Tr(\Sigma_{22}^2)$$

sedangkan Vektor Variansi (VV) dari  $\vec{X}^{(1)}$  dan  $\vec{X}^{(2)}$  adalah

$$Tr(\Sigma_{12}\Sigma_{21})$$

dengan  $Tr$  menyatakan *trace* dari suatu matriks.

Pendekatan distribusi dari  $\frac{1}{\sqrt{n-1}}(Tr(S^2) - Tr(\Sigma^2))$  adalah distribusi normal dengan rataan (mean) = 0 dan variansi  $\sigma^2 = 8Tr(\Sigma^4)$ . Nilai dari variansi ini akan digunakan untuk membentuk statistik dalam rangka membuat suatu bagan kendali dari Vektor Variansi.



#### D. Penaksiran Parameter

Pada umumnya matriks kovarians populasi  $\Sigma$  tidak diketahui, sehingga perlu ditaksir oleh matriks kovariansi sampel  $\mathbf{S}$ . Jika matriks kovariansi sampel  $\mathbf{S}$  berukuran  $p \times p$  sebagaimana ditunjukkan pada persamaan (2.8), maka  $vec(\mathbf{S})$  adalah representasi dari matriks  $\mathbf{S}$  dalam bentuk vektor berukuran  $p^2 \times 1$ , dinyatakan sebagai berikut :

$$vec(\mathbf{S}) = \begin{bmatrix} S_{11} \\ S_{21} \\ \vdots \\ S_{p1} \\ S_{12} \\ S_{22} \\ \vdots \\ S_{p2} \\ \vdots \\ \vdots \\ S_{1p} \\ S_{2p} \\ \vdots \\ S_{pp} \end{bmatrix} \quad (2.20)$$

dibawah asumsi kenormalan,  $vec(\mathbf{S})$  konvergen ke distribusi normal  $p$  variate, yaitu :

$$vec(\mathbf{S}) \xrightarrow{d} N_p(vec(\Sigma), \frac{1}{n-1} (I_{p^2+k} (\Sigma \otimes \Sigma))) \quad (2.21)$$

sedangkan  $\sqrt{n-1} \{Tr(S^2) - Tr(\Sigma^2)\}$  konvergen ke distribusi normal dengan rata-rata 0 dan variansi  $\sigma^2 = 8 Tr(R^4)$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

$$E \{Tr(S^2)\} = Tr(\Sigma^2) \quad (2.22)$$

dan

$$\text{var}\{Tr(S^2)\} = \frac{8}{n-1} Tr(\Sigma^4) \quad (2.23)$$

Pada aplikasi akan diperlukan nilai taksiran tak bias dari  $Tr(\Sigma^2)$  dan  $Tr(\Sigma^4)$ , dimana nilai tersebut berasal dari nilai sampel. Oleh karena itu, Nasrah (2010) menuliskan tentang taksiran tak bias dari  $Tr(\Sigma^2)$  dan  $Tr(\Sigma^4)$ , adalah sebagai berikut :

- Untuk  $n_1, n_2, \dots, n_m$  berbeda

$$E\left[Tr \bar{S}_{gab}^2\right] = \left(1 + \frac{2}{n-m}\right)^{-1} Tr \bar{S}_{gab}^2,$$

$$\text{var } Tr \bar{S}_{gab}^2 = \frac{8}{n-1} \left\{1 + \frac{12}{n-m} + \frac{12}{(n-m)^2}\right\}^{-1} Tr \bar{S}_{gab}^4$$

- Untuk  $n_1 = n_2 = \dots = n_m = n_0$

$$E\left[Tr \bar{S}^2\right] = \left(1 + \frac{2}{m n_0 - 1}\right)^{-1} Tr \bar{S}^2,$$

$$\text{var } Tr \bar{S}^2 = \frac{8}{n_0 - 1} \left(1 + \frac{12}{m n_0 - 1} + \frac{12}{(m n_0 - 1)^2}\right)^{-1} Tr \bar{S}^4$$

Dimana :

$n_1, n_2, \dots, n_m$  menyatakan jumlah sampel pada sub grup ke-1, 2, ..., m

$$\bar{S}_{gab} = \frac{\sum_{i=1}^m n_i - 1 S_i}{\sum_{i=1}^m n_i - 1} = \frac{1}{n - m} \sum_{i=1}^m n_i - 1 S_i \quad ; \quad \text{dimana} \quad n = \sum_{i=1}^m n_i$$

### E. Pengendalian Proses Statistik Multivariate (MSPC)

Pengendalian kualitas *multivariate* dalam proses produksi tidak hanya difokuskan untuk memonitoring rata-rata, akan tetapi pemantauan terhadap variasi proses juga. Variabilitas proses *multivariate* dapat dinyatakan dalam bentuk matriks kovariansi  $S$  berukuran  $p \times p$ , dimana elemen diagonal utama merupakan nilai variabilitas dari masing-masing karakteristik kualitas dan elemen selain diagonal utama merupakan nilai kovariansi antar karakteristik kualitas.

Pengendalian kualitas multivariate dilakukan apabila ada korelasi antara variabel sehingga tidak dapat dilakukan pengendalian proses secara sendiri-sendiri karena jika hal itu dilakukan akan menimbulkan kesalahan dalam pengambilan kesimpulan. Oleh karena itu, pengendalian haruslah secara bersamaan yang kemudian disebut dengan pengendalian proses multivariate, Montgomery (2001).

Pengendalian kualitas multivariate biasanya dilakukan untuk mengendalikan vektor mean dan variabilitas proses. Pada tugas akhir ini akan dikaji tentang pengendalian variabilitas proses multivariate. Para peneliti pendahuluan telah melakukan penelitian ini salah satunya Sindelar (2007) yang

mendalami tentang statistik determinan S, determinan R, G, dan W. Pada tugas akhir ini akan dikaji tentang bagaimana Vektor Variansi diaplikasikan untuk pengendalian proses multivariate pada data cuaca di kota Semarang. Vektor Variansi ini pertama kali diperkenalkan oleh Djauhari (2007), dan telah terbukti bahwa variansi vektor ini merupakan suatu ukuran dispersi multivariate. (Djauhari 2008, 2011).

## F. Beberapa Definisi dan Rumus-rumus pendukung

### 1. Perkalian Kronecker

#### Definisi 2.1

Misalkan A dan B dua buah matriks masing-masing berukuran  $m \times n$  dan  $p \times q$ , maka perkalian Kronecker (*Kronecker product*) dari A dan B dinotasikan sebagai  $A \otimes B$ , yaitu suatu matriks berukuran  $mp \times nq$  didefinisikan sebagai,

$$A \otimes B = \begin{bmatrix} a_{11}B & a_{12}B & \cdots & a_{1n}B \\ a_{21}B & a_{22}B & \cdots & a_{2n}B \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}B & a_{m2}B & \cdots & a_{mn}B \end{bmatrix} \quad (2.23)$$

#### Contoh

Misalkan matriks  $A_{2 \times 3} = \begin{bmatrix} 6 & 5 & 4 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$  dan  $B_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ , maka

$$(a) \quad A_{2 \times 3} \otimes B_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} 6B & 5B & 4B \\ 1B & 2B & 3B \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 6 \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} & 5 \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} & 4 \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \\ 1 \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} & 2 \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} & 3 \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \end{bmatrix}$$

$$A \otimes B = \begin{bmatrix} 24 & 6 & 20 & 5 & 16 & 4 \\ 18 & 12 & 15 & 10 & 12 & 8 \\ 4 & 1 & 8 & 2 & 12 & 3 \\ 3 & 2 & 6 & 4 & 9 & 6 \end{bmatrix} = C_{4 \times 6} \text{ dan}$$

$$(b) B \otimes A = \begin{bmatrix} 4A & 1A \\ 3A & 2A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \begin{pmatrix} 6 & 5 & 4 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} & 1 \begin{pmatrix} 6 & 5 & 4 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \\ 3 \begin{pmatrix} 6 & 5 & 4 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} & 2 \begin{pmatrix} 6 & 5 & 4 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 24 & 30 & 16 & 6 & 5 & 4 \\ 4 & 8 & 12 & 1 & 2 & 3 \\ 18 & 15 & 12 & 12 & 10 & 8 \\ 3 & 2 & 6 & 2 & 4 & 6 \end{bmatrix} = D_{4 \times 6}$$

Tampak bahwa  $A \otimes B \neq B \otimes A$  (tidak komutatif)

## 2. Matriks Komutasi (The Commutation Matrix)

Matriks komutasi adalah sebuah matriks bujur sangkar, dimana setiap kolom dan setiap barisnya hanya mengandung sebuah unsur 1 pada posisi  $(i, j)$  dan yang lainnya adalah nol. Matriks komutasi ini banyak digunakan ketika perhitungan momen dari distribusi normal multivariate. Matriks komutasi dapat dibangun dengan memanfaatkan matriks-matriks identitas



kolom pertama dari  $I_2$  adalah  $\mathbf{e}_{1,2} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$  dan kolom kedua dari  $I_3$  adalah  $\mathbf{e}_{3,3} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ,

maka

$$H_{12} = \mathbf{e}_{1,2} \mathbf{e}_{2,3}^t = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{sehingga } H_{12} \otimes H_{12}^t = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

kolom pertama dari  $I_2$  adalah  $\mathbf{e}_{1,2} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$  dan kolom ketiga dari  $I_3$  adalah  $\mathbf{e}_{3,3} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ , maka

$$H_{13} = \mathbf{e}_{1,2} \mathbf{e}_{3,3}^t = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{sehingga } H_{13} \otimes H_{13}^t = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

kolom kedua dari  $I_2$  adalah  $\mathbf{e}_{2,2} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$  dan kolom pertama dari  $I_3$  adalah

$\mathbf{e}_{1,3} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ , maka

$$H_{21} = \mathbf{e}_{2,2} \mathbf{e}_{1,3}^t = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{sehingga } H_{21} \otimes H_{21}^t = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

kolom kedua dari  $I_2$  adalah  $\mathbf{e}_{2,2} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$  dan kolom kedua dari  $I_3$  adalah  $\mathbf{e}_{3,3} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ,

maka

$$H_{22} = \mathbf{e}_{2,2} \mathbf{e}_{2,3}^t = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} [0 \ 1 \ 0] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{sehingga } H_{22} \otimes H_{22}^t = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

kolom kedua dari  $I_2$  adalah  $\mathbf{e}_{2,2} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$  dan kolom ketiga dari  $I_3$  adalah  $\mathbf{e}_{3,3} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ,

maka

$$H_{23} = \mathbf{e}_{2,2} \mathbf{e}_{2,3}^t = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} [0 \ 0 \ 1] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{sehingga } H_{23} \otimes H_{23}^t = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

diperoleh Matriks komutasinya adalah

$$\begin{aligned} K_{2,3} &= \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^3 (H_{ij} \otimes H_{ij}^t) \\ &= \sum_{i=1}^2 \{(H_{i1} \otimes H_{i1}^t) + (H_{i2} \otimes H_{i2}^t) + (H_{i3} \otimes H_{i3}^t)\} \\ &= [(H_{11} \otimes H_{11}^t) + (H_{12} \otimes H_{12}^t) + (H_{13} \otimes H_{13}^t)] + [(H_{21} \otimes H_{21}^t) + \\ &\quad (H_{22} \otimes H_{22}^t) + (H_{23} \otimes H_{23}^t)] \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Dapat ditunjukkan bahwa  $K_{23} = K_{32}^t$  (sifat)



## Matriks Simetri dan Matriks diagonal

### Definisi 2.3 (Matriks simetri)

Suatu matriks bujur sangkar  $A$  dikatakan **simetri** jika  $A = A^t$  atau  $a_{ij} = a_{ji}$ ,  $\forall i, j \in N$

### Definisi 2.4 (Matriks diagonal)

Matriks diagonal adalah suatu matriks bujur sangkar yang semua elemen yang bukan diagonal utama adalah nol.

### Definisi 2.5 (Trace Matriks)

*Trace* dari matriks bujur sangkar  $A_{n \times n}$  didefinisikan sebagai jumlah elemen-elemen diagonal utamanya, ditulis :

$$Tr(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$$

## Sifat-sifat Trace Matriks

Misalkan matriks  $A$  berukuran  $m \times n$  dan  $B$  berukuran  $n \times m$ , maka matriks  $A$  dan  $B$  berukuran  $m \times m$ . Berlaku

$$(a). \quad Tr(A + B) = Tr(A) + Tr(B)$$

$$(b) \quad Tr(AB) = Tr(BA)$$

$$(c) \quad Tr(A) = Tr(A^t)$$

## 3. Operator Vec

Operator yang mentransformasikan matriks kedalam bentuk vektor disebut "operator *vec*" disingkat "*vec*". Jika  $A$  adalah matriks berukuran  $m \times n$

dengan kolom ke- $i$  adalah  $\mathbf{a}_i$ , maka  $\text{vec}(A)$  adalah sebuah vektor berukuran  $mn \times 1$  dan dinyatakan sebagai

$$\text{vec}(A) = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \mathbf{a}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{a}_n \end{bmatrix} \quad (2.26)$$

yakni suatu matriks di transformasi ke dalam bentuk vektor, dimana kolom-kolom matriks disusun menjadi 1 kolom saja sehingga membentuk vec. (Schott, JR, 1997)

Contoh

Misal matriks  $A_{2 \times 3} = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 3 \\ 1 & 4 & 0 \end{bmatrix}$ , maka  $\text{vec}(A) = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \\ 4 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$

Hubungan antara vec dengan perkalian kroneker dapat dilihat dari sifat berikut

$$\text{vec}(\mathbf{ab}^t) = \mathbf{b} \otimes \mathbf{a} \quad (2.27)$$

Dimana  $\mathbf{a}$  dan  $\mathbf{b}$  dua buah vektor berukuran sama

Contoh

Misalkan diberikan dua vektor berukuran sama  $3 \times 1$ , yakni

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} \text{ dan } \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}, \text{ maka}$$

$$\text{a. } \mathbf{ab}^t = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} [0 \ 2 \ 5] = \begin{bmatrix} 1.0 & 1.2 & 1.5 \\ 3.0 & 3.2 & 3.5 \\ 4.0 & 4.2 & 4.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 5 \\ 0 & 6 & 15 \\ 0 & 8 & 20 \end{bmatrix}$$

$$\text{b. } \text{vec}(\mathbf{ab}^t) = \text{vec} \left( \begin{bmatrix} 0 & 2 & 5 \\ 0 & 6 & 15 \\ 0 & 8 & 20 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \\ 6 \\ 8 \\ 5 \\ 15 \\ 20 \end{bmatrix}$$

$$\text{c. } \mathbf{b} \otimes \mathbf{a} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0\mathbf{a} \\ 2\mathbf{a} \\ 5\mathbf{a} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} \\ 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} \\ 5 \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \\ 6 \\ 8 \\ 5 \\ 15 \\ 20 \end{bmatrix}$$

Tampak bahwa  $\text{vec}(\mathbf{ab}^t) = \mathbf{b} \otimes \mathbf{a}$

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Sumber Data**

Jenis penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan literatur berupa buku dan jurnal yang berhubungan dengan pengendalian proses variabilitas multivariate. Sumber data yang akan digunakan sebagai contoh pada penelitian merupakan data Sekunder dari Badan Meteorologi dan Geofisika Kota Semarang

#### **B. Variabel Yang Terlibat**

Dalam penelitian ini merupakan penelitian multivariate dengan melibatkan beberapa peubah yakni pada curah hujan, suhu udara, kelembaban udara dan kecepatan angin. Keempat peubah ini merupakan factor-faktor yang mempengaruhi cuaca. Selanjutnya variabel pertama disebut  $X_1$  variabel kedua disebut  $X_2$  dan Variabel ketiga disebut  $X_3$  dan variabel keempat disebut  $X_4$  dimana:

$X_1$  : curah hujan

$X_2$  : suhu udara

$X_3$  : kelembaban udara


$X_4$  : kecepatan angin

### **C. Prosedur dan Langkah-Langkah Penentuan bagan kendali**

1. Menentukan variable-variabel penelitian dan jumlah sampel
2. Menentukan matriks varians-kovariansi sampel
3. Menentukan Vektor Variansi (VV)
4. Menaksir parameter dari Vektor Variansi
5. Menentukan batas-batas kendali (BKA dan BKB) yang dibangun berdasarkan Vektor Variansi
6. Jika terdapat data yang out of control maka data yang berada di luar kontrol dihilangkan dan diulangi no 5 sampai semua data ada di dalam kontrol.
7. Diperoleh batas kendali atas dan bawah untuk semua data berada dalam pengontrolan
8. Memonitoring Data Selanjutnya

### D. Alur Kerja

Alur kerja adalah bagian dari sistematika penulisan karya ilmiah untuk lebih terarah dan fokus terhadap apa yang akan diteliti. Langkah-langkah dalam alur kerja tersebut adalah sebagai berikut:



## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Vektor Variansi

Misalkan  $\vec{X}_1, \vec{X}_2, \dots, \vec{X}_N$  adalah vektor-vektor acak yang saling bebas dan memiliki distribusi identik, sehingga vektor acak  $\vec{X}$  berdistribusi normal p variat dengan vektor mean  $\vec{\mu}$  dan matriks kovariansi  $\Sigma$  atau dituliskan dalam lambang

$$\vec{X} \sim N_p(\vec{\mu}, \Sigma) \quad (4.1)$$

dimana  $N$  = jumlah (ukuran) sampel

$p$  = banyaknya peubah dan

$$\vec{X} = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_p \end{bmatrix}$$

Pada kasus univariat , jika  $X_1, X_2, \dots, X_n$  adalah sampel acak dengan  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ . Misalkan  $\Sigma$  adalah matriks varian kovarians dari  $\vec{X}$  , maka matriks variansi kovariansi sampel dari  $\vec{X}$  adalah  $\mathbf{S}$ , dimana

$$\mathbf{\Sigma}_{p \times p} = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \cdots & \sigma_{1p} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \cdots & \sigma_{2p} \\ \vdots & \cdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{p1} & \sigma_{p2} & \cdots & \sigma_{pp} \end{bmatrix} ; \quad \mathbf{S}_{p \times p} = \begin{bmatrix} s_{11} & s_{12} & \cdots & s_{1p} \\ s_{21} & s_{22} & \cdots & s_{2p} \\ \vdots & \cdots & \ddots & \vdots \\ s_{p1} & s_{p2} & \cdots & s_{pp} \end{bmatrix}$$

dengan

$$s_{ik} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (X_{ij} - \bar{X}_i)(X_{kj} - \bar{X}_k), i = 1, 2, \dots, p, k = 1, 2, \dots, p$$

maka  $vec(S)$  dapat ditulis sebagai

$$vec(S) = \begin{bmatrix} s_{11} \\ s_{21} \\ \vdots \\ s_{p1} \\ s_{12} \\ s_{22} \\ \vdots \\ s_{p2} \\ \vdots \\ s_{1p} \\ s_{2p} \\ \vdots \\ s_{pp} \end{bmatrix} \quad (4.2)$$



Selanjutnya, dapat dituliskan bahwa

$$(\text{vec}(\mathbf{S}))^t(\text{vec}(\mathbf{S})) = [s_{11} \ s_{21} \ \cdots \ s_{p1} \ s_{12} \ s_{22} \ \cdots \ s_{p2} \ \cdots \ s_{1p} \ s_{2p} \ \cdots \ s_{pp}] \begin{bmatrix} s_{11} \\ s_{21} \\ \vdots \\ s_{p1} \\ s_{12} \\ s_{22} \\ \vdots \\ s_{p2} \\ \vdots \\ s_{1p} \\ s_{2p} \\ \vdots \\ s_{pp} \end{bmatrix}$$

$$= s_{11}^2 + s_{21}^2 + \cdots + s_{p1}^2 + s_{12}^2 + s_{22}^2 + \cdots + s_{p2}^2 + \cdots + s_{1p}^2 + s_{2p}^2 + \cdots + s_{pp}^2$$

Adapun

$$\text{Tr}(\mathbf{S}^2) = \text{Tr}(\mathbf{S}\mathbf{S})$$

$$= \text{Tr} \left( \begin{pmatrix} s_{11} & s_{12} & \cdots & s_{1p} \\ s_{21} & s_{22} & \cdots & s_{2p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ s_{p1} & s_{p2} & \cdots & s_{pp} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s_{11} & s_{12} & \cdots & s_{1p} \\ s_{21} & s_{22} & \cdots & s_{2p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ s_{p1} & s_{p2} & \cdots & s_{pp} \end{pmatrix} \right)$$

$$= \text{Tr} \begin{pmatrix} s_{11}^2 + s_{12}s_{21} + \cdots + s_{1p}s_{p1} & s_{11}s_{12} + s_{12}s_{22} + \cdots + s_{1p}s_{p2} & \cdots & s_{11}s_{1p} + s_{12}s_{2p} + \cdots + s_{1p}s_{pp} \\ s_{21}s_{11} + s_{22}s_{21} + \cdots + s_{2p}s_{p1} & s_{21}s_{12} + s_{22}^2 + \cdots + s_{2p}s_{p2} & \cdots & s_{21}s_{1p} + s_{22}s_{2p} + \cdots + s_{2p}s_{pp} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ s_{p1}s_{11} + s_{p2}s_{21} + \cdots + s_{pp}s_{p1} & s_{p1}s_{12} + s_{p2}s_{22} + \cdots + s_{pp}s_{p2} & \cdots & s_{p1}s_{1p} + s_{p2}s_{2p} + \cdots + s_{pp}^2 \end{pmatrix}$$

$$= s_{11}^2 + s_{12}s_{21} + \cdots + s_{1p}s_{p1} + s_{21}s_{12} + s_{22}^2 + \cdots + s_{2p}s_{p2} + \cdots + s_{p1}s_{1p} + s_{p2}s_{2p} + \cdots + s_{pp}^2,$$

Karena  $S$  merupakan matriks simetri maka  $s_{ij} = s_{ji}$  untuk setiap  $i, j = 1, 2, \dots, p$ , maka berlaku

$$Tr(\hat{S}^2) = s_{11}^2 + s_{21}^2 + \dots + s_{p1}^2 + s_{12}^2 + s_{22}^2 + \dots + s_{p2}^2 + \dots + s_{1p}^2 + s_{2p}^2 + \dots + s_{pp}^2, \quad (4.3)$$

Dengan demikian Vektor Variansi sampel  $Tr(\hat{S}^2) = (\text{vec}(\mathbf{S}))^t(\text{vec}(\mathbf{S}))$  merupakan jumlah elemen-elemen diagonal dari matriks  $\mathbf{S}^2$ , yaitu

$$Tr(\mathbf{S}^2) = \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^p s_{ij}^2 \quad (4.4)$$

## B. Bagan Kendali Vektor Variansi

Vektor Variansi dapat digunakan untuk pengendalian variabilitas proses. Salah satu caranya adalah dengan membentuk bagan kendali dengan menggunakan statistik Vektor Variansi tersebut.

### Kasus 1

Misalkan suatu sub grup ke 1, 2, ..., m memiliki jumlah sampel yang berbeda, selanjutnya jumlah sampel dari setiap sub grup itu disebut dengan  $n_1 \neq n_2 \neq n_3 \dots \neq n_m$ . Statistik yang akan digunakan adalah :

$$Tr(\mathbf{S}^2) \sim N(Tr(\mathbf{\Sigma}^2), \frac{8}{n-1} Tr(\mathbf{\Sigma}^4)) \quad (4.5)$$

adapun mean dari  $Tr(\mathbf{S}^2)$  adalah  $Tr(\mathbf{\Sigma}^2)$  dan variansi dari  $Tr(\mathbf{S}^2)$  adalah  $\frac{8}{n-1} Tr(\mathbf{\Sigma}^4)$ . Adapun nilai taksiran adalah :

$$E\left[Tr \bar{S}_{gab}^2\right] = \left(1 + \frac{2}{n-m}\right)^{-1} Tr \bar{S}_{gab}^2 \quad (4.5a)$$

$$\text{var } Tr \bar{S}_{gab}^2 = \frac{8}{n-1} \left\{ 1 + \frac{12}{n-m} + \frac{12}{(n-m)^2} \right\}^{-1} Tr \bar{S}_{gab}^4 \quad (4.5b)$$

Jadi bagan kendali dari  $Tr(\mathbf{S}^2)$  adalah sebagai berikut :

Batas kendali atas (BKA) :

$$\left( 1 + \frac{2}{n-m} \right) Tr(\bar{S}_{gab}^2) + 3 \sqrt{\frac{8}{n-1} \left\{ 1 + \frac{12}{n-m} + \frac{12}{(n-m)^2} \right\}^{-1} Tr(\bar{S}_{gab}^4)} \quad (4.5c)$$

Garis tengah :

$$\left( 1 + \frac{2}{n-m} \right) Tr(\bar{S}_{gab}^2) \quad (4.5d)$$

Batas kendali bawah (BKB) :

$$\left( 1 + \frac{2}{n-m} \right) Tr(\bar{S}_{gab}^2) - 3 \sqrt{\frac{8}{n-1} \left\{ 1 + \frac{12}{n-m} + \frac{12}{(n-m)^2} \right\}^{-1} Tr(\bar{S}_{gab}^4)} \quad (4.5e)$$

dimana

$$\bar{S}_{gab} = \frac{\sum_{i=1}^m n_i - 1 S_i}{\sum_{i=1}^m n_i - 1} = \frac{1}{n-m} \sum_{i=1}^m n_i - 1 S_i \quad (4.5d)$$

$$n = \sum_{i=1}^m n_i$$

Kasus 2

Misalkan suatu sub grup ke 1, 2, ..., m memiliki jumlah sampel yang sama, selanjutnya jumlah sampel dari setiap sub grup itu disebut dengan  $n_1 = n_2 = n_3 \dots = n_m = n_0$ . Statistik yang akan digunakan adalah :

$$Tr(\mathbf{S}^2) \sim N(Tr(\boldsymbol{\Sigma}^2), \frac{8}{n-1} Tr(\boldsymbol{\Sigma}^4)) \quad (4.6)$$

adapun mean dari  $Tr(\mathbf{S}^2)$  adalah  $Tr(\boldsymbol{\Sigma}^2)$  dan variansi dari  $Tr(\mathbf{S}^2)$  adalah  $\frac{8}{n-1}Tr(\boldsymbol{\Sigma}^4)$ . Adapun nilai taksirannya adalah

$$E\left[Tr \bar{S}^2\right] = \left(1 + \frac{2}{m(n_0-1)}\right)^{-1} Tr \bar{S}^2, \quad (4.6a)$$

$$\text{var } Tr \bar{S}^2 = \frac{8}{n_0-1} \left(1 + \frac{12}{m(n_0-1)} + \frac{12}{m(n_0-1)^2}\right)^{-1} Tr \bar{S}^4 \quad (4.6b)$$

dimana :

$n_1, n_2, \dots, n_m$  menyatakan jumlah sampel pada sub grup ke-1, 2, ..., m

Jadi bagan kendali dari  $Tr(\mathbf{S}^2)$  adalah sebagai berikut :

Batas kendali atas (BKA) :

$$\left(1 + \frac{2}{m(n_0-1)}\right) Tr(\bar{S}_{gab}^2) + 3 \sqrt{\frac{8}{n_0-1} \left\{1 + \frac{12}{m(n_0-1)} + \frac{12}{(m(n_0-1))^2}\right\}^{-1} Tr(\bar{S}_{gab}^4)} \quad (4.6c)$$

Garis tengah :

$$\left(1 + \frac{2}{m(n_0-1)}\right) Tr(\bar{S}_{gab}^2) \quad (4.6d)$$

Batas kendali bawah (BKB) :

$$\left(1 + \frac{2}{m(n_0-1)}\right) Tr(\bar{S}_{gab}^2) - 3 \sqrt{\frac{8}{n_0-1} \left\{1 + \frac{12}{m(n_0-1)} + \frac{12}{(m(n_0-1))^2}\right\}^{-1} Tr(\bar{S}_{gab}^4)} \quad (4.6e)$$

Berdasarkan batas batas inilah akan dilakukan pengendalian proses multivariate dari data cuaca di Kota Semarang.

### C. Bagan Kendali $Tr(\bar{S}^2)$ pada Data Cuaca di Semarang

Analisis data berikut merupakan data sekunder yang diambil berdasarkan curah hujan, suhu bulanan, kelembaban udara, dan kecepatan angin, sumber dapat dilihat pada lampiran 1. Pada analisis tersebut penulis membagi dalam 2 fase yakni fase 1 sebagai data pendahuluan untuk mendapatkan batas kendali atas dan batas kendali bawah serta fase 2 sebagai data monitoring. Analisis data tersebut untuk fase I adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Matriks Kovariansi sampel tahun 2001-2003

Tahun	Matriks	$Tr(\bar{S}^2)$
2001	$\begin{bmatrix} 12680,984 & -25,809 & 428,752 & -3,932 \\ -25,809 & 0,367 & -1,503 & -0,114 \\ 428,752 & -1,503 & 25,639 & 1,422 \\ -3932 & -0,114 & 1,422 & 1,037 \end{bmatrix}$	161177038,1
2002	$\begin{bmatrix} 13899,416 & -44,175 & 518,105 & -32,169 \\ -44,175 & 0,462 & -2,514 & 0,253 \\ 518,105 & -2,514 & 27,409 & -3,017 \\ -32,169 & 0,253 & -3,017 & 1,386 \end{bmatrix}$	193737388,4
2003	$\begin{bmatrix} 18238,105 & -43,330 & 846,652 & 6,743 \\ -43,330 & 0,437 & -3,817 & -0,039 \\ 846,652 & -3,817 & 60,656 & -1,45 \\ 6,743 & -0,039 & -1,45 & 0,956 \end{bmatrix}$	334069672
Rata-rata	$\begin{bmatrix} 12258,495 & -48,025 & 504,49 & -61,233 \\ -48,025 & 0,462 & -2,727 & 0,345 \\ 504,49 & -2,727 & 28,373 & -3911 \\ -61,233 & 0,345 & -3911 & 1,063 \end{bmatrix}$	223907980,2

Berdasarkan tabel tersebut dimana diketahui nilai rata-rata untuk  $Tr(\bar{S}^2)$  adalah 223907980,2 selanjutnya dapat pula dihitung untuk nilai  $Tr(\bar{S}^4)$

yaitu  $5,01347E+16$  sehingga dengan demikian untuk mengetahui grafik bagan kendalinya maka harus ditentukan batas-batas kendali dari  $\text{Tr}(\mathbf{S}^2)$ .

### Batas-batas Bagan Kendali $\text{Tr}(\mathbf{S}^2)$

Untuk  $m = 3$  dan ukuran sampel  $n_0 = 12$ , maka diperoleh

Batas kendali atas (BKA) :

$$\begin{aligned} \text{BKA} &= \left(1 + \frac{2}{m(n_0-1)}\right) \text{Tr}(\bar{S}_{gab}^2) + 3\sqrt{\frac{8}{n_0-1} \left\{1 + \frac{12}{m(n_0-1)} + \frac{12}{(m(n_0-1))^2}\right\}^{-1} \text{Tr}(\bar{S}_{gab}^4)} \\ &= \left(1 + \frac{2}{3(12-1)}\right) (223907980,2) + 3\sqrt{\frac{8}{12-1} \left\{1 + \frac{12}{3(12-1)} + \frac{12}{(3(12-1))^2}\right\}^{-1} (5,013 \cdot 10^{16})} \\ &= \left(1 + \frac{2}{3(11)}\right) (223907980,2) + 3\sqrt{\frac{8}{11} \left\{1 + \frac{12}{3(11)} + \frac{12}{(3(11))^2}\right\}^{-1} (5,013 \cdot 10^{16})} \\ &= 2,37 \cdot 10^8 + 4,89 \cdot 10^8 \\ &= 7,26 \cdot 10^8 \end{aligned}$$

Garis tengah (GT) :

$$\begin{aligned} GT &= \left(1 + \frac{2}{m(n_0-1)}\right) \text{Tr}(\bar{S}_{gab}^2) \\ &= \left(1 + \frac{2}{3(12-1)}\right) (223907980,2) \\ &= \left(1 + \frac{2}{3(11)}\right) (223907980,2) \\ &= 2,37 \cdot 10^8 \end{aligned}$$


Batas kendali bawah (BKB) :

$$\begin{aligned} \text{BKB} &= \left(1 + \frac{2}{m(n_0-1)}\right) \text{Tr}(\bar{S}_{gab}^2) - 3\sqrt{\frac{8}{n_0-1} \left\{1 + \frac{12}{m(n_0-1)} + \frac{12}{(m(n_0-1))^2}\right\}^{-1} \text{Tr}(\bar{S}_{gab}^4)} \\ &= \left(1 + \frac{2}{3(12-1)}\right) (223907980,2) - 3\sqrt{\frac{8}{12-1} \left\{1 + \frac{12}{3(12-1)} + \frac{12}{(3(12-1))^2}\right\}^{-1} (5,013 \cdot 10^{16})} \end{aligned}$$

$$= \left(1 + \frac{2}{3(11)}\right) (223907980,2) - 3 \sqrt{\frac{8}{11} \left\{1 + \frac{12}{3(11)} + \frac{12}{(3(11))^2}\right\}^{-1}} (5,013 \cdot 10^{16})$$

$$= -2,51 \cdot 10^8$$

Adapun bagan kendali tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :




Gambar 4.1. Grafik bagan kendali Vektor Variansi pada data pendahuluan cuaca di Kota Semarang

Berdasarkan grafik di atas, seluruh data pendahuluan berada di dalam pengendalian, sehingga batas kendali yang diperoleh dapat digunakan untuk memonitoring data selanjutnya yaitu data tahun 2004 dan 2005 sebagai fase ke II (Fase monitoring). Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Matriks Kovariansi sampel tahun 2004-2005

Tahun	Matriks	$Tr(\bar{S}^2)$
2004	$\begin{bmatrix} 12258,495 & -48,025 & 504,49 & -61,233 \\ -48,025 & 0,462 & -2,727 & 0,345 \\ 504,49 & -2,727 & 28,373 & -3911 \\ -61,233 & 0,345 & -3911 & 1,063 \end{bmatrix}$	15079268,2
2005	$\begin{bmatrix} 7702,719 & -18,663 & 315,790 & 607,472 \\ -18,663 & 0,289 & -1,513 & -3,148 \\ 315,790 & -1,513 & 20,354 & 24181 \\ 607,472 & -3,148 & 24181 & 257,059 \end{bmatrix}$	60337756,6

Adapun bagan kendali tersebut dapat digambarkan sebagai berikut



Gambar 4.2. Grafik bagan kendali Vektor Variansi pada data memonitoring cuaca di Kota Semarang

Berdasarkan gambar ini tahun 2004 dan 2005 memiliki nilai yang masih berada dalam batas pengendalian.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Vektor Variansi dapat dinyatakan dalam bentuk :

$$Tr(\mathbf{S}^2) = (\text{vec}(\mathbf{S}))^t(\text{vec}(\mathbf{S}))$$

2. Batas kendali dari variansi vektor berdasarkan jenis dari data adalah :

- a. Jika jumlah sampel yang berbeda,  $n_1 \neq n_2 \neq n_2 \dots \neq n_m$ . maka bagan kendali dari  $Tr(\mathbf{S}^2)$  adalah sebagai berikut :

Batas kendali atas (BKA) :

$$\left(1 + \frac{2}{n-m}\right) Tr(\bar{S}_{gab}^2) + 3\sqrt{\frac{8}{n-1} \left\{1 + \frac{12}{n-m} + \frac{12}{(n-m)^2}\right\}^{-1} Tr(\bar{S}_{gab}^4)}$$

Garis tengah :

$$\left(1 + \frac{2}{n-m}\right) Tr(\bar{S}_{gab}^2)$$

Batas kendali bawah (BKB)

$$\left(1 + \frac{2}{n-m}\right) Tr(\bar{S}_{gab}^2) - 3\sqrt{\frac{8}{n-1} \left\{1 + \frac{12}{n-m} + \frac{12}{(n-m)^2}\right\}^{-1} Tr(\bar{S}_{gab}^4)}$$

- b. Jika jumlah sampel yang sama, dengan  $n_1 = n_2 = n_2 \dots = n_m = n_0$  maka bagan kendali dari  $Tr(\mathbf{S}^2)$  adalah sebagai berikut :

Batas kendali atas (BKA)

$$\left(1 + \frac{2}{m(n_0-1)}\right) Tr(\bar{S}_{gab}^2) + 3 \sqrt{\frac{8}{n_0-1} \left\{1 + \frac{12}{m(n_0-1)} + \frac{12}{(m(n_0-1))^2}\right\}^{-1} Tr(\bar{S}_{gab}^4)}$$

Garis tengah :

$$\left(1 + \frac{2}{m(n_0-1)}\right) Tr(\bar{S}_{gab}^2)$$

Batas kendali bawah (BKB) :

$$\left(1 + \frac{2}{m(n_0-1)}\right) Tr(\bar{S}_{gab}^2) - 3 \sqrt{\frac{8}{n_0-1} \left\{1 + \frac{12}{m(n_0-1)} + \frac{12}{(m(n_0-1))^2}\right\}^{-1} Tr(\bar{S}_{gab}^4)}$$

3. Batas kendali variansi vektor dari data cuaca di semarang adalah sebagai berikut :

$$\text{BKA} : 7,26 \cdot 10^8$$

$$\text{GT} : 2,37 \cdot 10^8$$

$$\text{BKB} : -2,51 \cdot 10^8$$

## B. Saran

Diharapkan para peneliti selanjutnya menstandarkan variabel dari data cuaca ini, karena keragaman pengukuran membuat nilai dari setiap peubah bernilai besar. Selain itu, perlu adanya perbandingan dengan statistik lain agar dapat diperoleh manakah yang lebih efektif dan efisien, statistik Vektor Variansi atau determinan dari matriks kovariansi untuk data cuaca ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alt, F.B., dkk. 1985. *Multivariate Quality Control*. Encyclopedia of Statistical Sciences. John Wiley & Sons Inc. New York.
- Anderson, T.W. 2003. *An Introduction to Multivariate Statistical Analysis*. John Wiley & Sons Inc. New York.
- Djauhari, Maman A. 2011. *Geometric Interpretation of Vector Variance*. Universiti Teknologi Malaysia. Jurnal Matematika, Volume 27, Number 1, 51–57.
- \_\_\_\_\_. 2008. *A Robust Estimation of Location and Scatter*. Malaysian Journal of Mathematical Sciences 2(1), 1-24.
- \_\_\_\_\_. 2007. *A Measure of Data Concentration*. Journal of Applied Probability & Statistics. 2(2). Hal 139-155.
- Djauhari, Maman A., dkk. 2010. *How to Control Process Variability More Effectively: the case of a b-complex Vitamin production process*, (Online), (<http://sajie.journals.ac.za>, diakses 10 Maret 2013 jam 11.00)
- \_\_\_\_\_. 2008. *Multivariate Process Variability Monitoring, Communications in Statistics. ?????*
- Herwindiati, dkk. 2009. *The Robust Distance for Similarity Measure Of Content Based Image Retrieval*. Journal Proceedings of the World Congress on Engineering. Vol II.
- Montgomery, D. C. 2001. *Introduction to Statistical Quality Control* 4th edition. John Wiley & Sons Inc. New York.
- Sirajang, Nasrah. 2010. *Pengujian Hipotesis Kesamaan Matriks Kovariansi Melalui Vektor Variansi Untuk Beberapa Sampel*. Tesis. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Rencher, Alvin C. 2002. *Methods of Multivariate Analysis*. John Wiley & Sons Inc. New York.

Schott, J.R. 1997. *Matrix Analysis for Statistics*. John Wiley & Sons Inc. New York.

Sindelar, M.F. 2007. *Multivariate Statistical Process Control For Corellation Matrices*, Tesis Ph.D, University of Pittsburgh, Pittsburgh.

## Lampiran 1.

**DATA BULANAN SUHU UDARA, KELEMBABAN UDARA DAN KECEPATAN ANGIN  
SERTA HUJAN RATA-RATA**

tahun	data	Satuan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
2001	Suhu Udara	<sup>0</sup> c	26,9	26,6	26,6	27,6	28,6	27,5	27,4	27,1	28,3	28	27,7	27,2
	Kelembaban Udara	%	83	82	83	80	72	77	72	70	72	80	83	84
	Kecepatan Angin	Km/jam	46	48	53	69	88	75	74	94	94	55	46	46
	Curah Hujan	mm	329,37	345	400,33	273,77	199,8	262,47	43,267	8,9	126,3	223,8	217,03	169,37
2002	Suhu Udara	<sup>0</sup> c	26,5	26,5	27,1	27,6	28,7	28,1	27,4	27,7	27,8	28,5	28,3	27,4
	Kelembaban Udara	%	84	83	78	78	74	74	68	70	71	67	74	78
	Kecepatan Angin	Km/jam	4,8	5,1	3,7	3	6,4	6,8	6,2	7	6,4	6	5,2	5,5
	Curah Hujan	mm	274,77	382,57	185,73	102,5	82,933	22,233	6,1333	0,8667	2,2667	17,8	212,87	133,5
2003	Suhu Udara	<sup>0</sup> c	26,6	26,2	27,6	27,1	28,1	27,7	27,5	27,1	27,9	28,8	27,8	27,1
	Kelembaban Udara	%	85	86,3	77,8	83,8	72,5	70,8	67,8	66,3	64,8	64,8	76,5	82,3
	Kecepatan Angin	Km/jam	5,6	8,1	5,4	4,4	5,9	5,8	6,3	5,9	5,9	6,8	5,1	4,3
	Curah Hujan	mm	305,63	445,5	150	211,13	132,43	74,233	13,667	1,8667	88,8	189,43	305,2	367,33
2004	Suhu Udara	<sup>0</sup> c	26,5	26,5	27,1	27,6	28,7	28,1	27,4	27,7	27,8	28,5	28,3	27,4
	Kelembaban Udara	%	84,5	83,3	78,8	79,8	72	74	68,8	70	71,8	67,8	74,5	78
	Kecepatan Angin	Km/jam	4,8	5,1	3,7	3,9	6,4	6,8	6,2	7	6,4	6	5,2	5,5
	Curah Hujan	mm	295,4	339,17	80,2	180,07	104,23	22,033	50,833	0	61,633	21	171,87	261,43
2005	Suhu Udara	<sup>0</sup> c	27,1	27,2	27,4	28,2	28,8	28	27,5	27,6	28,1	28,2	28,3	27
	Kelembaban Udara	%	82	82	82	78	72	78	72	70	72	75	75	83
	Kecepatan Angin	Km/jam	6,4	5,9	6,2	6,3	7,1	6,5	6,3	6,2	6,2	5,6	5,4	4,7
	Curah Hujan	mm	282,13	149,6	218,7	179,73	92,133	105,83	8,5	73,133	28,7	155,4	220,87	285,67

*Sumber: Badan Meteorologi dan Geofisika Kota Semarang*

## Lampiran II. Data analisis melalui program maple 15

> restart;

>  $a := \left(1 + \frac{2}{3(12-1)}\right) \cdot (223907980.2);$

$a := 2.374781608 \cdot 10^8$

>  $b := 3 \cdot \left( \text{sqrt} \left( \frac{8}{(12-1)} \left( 1 + \frac{12}{3 \cdot (12-1)} + \frac{12}{(3 \cdot (12-1))^2} \right)^{-1} \right) \cdot (5.013 \cdot 10^{16}) \right);$

$b := 4.885643769 \cdot 10^8$

>  $y := a + b;$

$y := 7.260425377 \cdot 10^8$

>

>  $gt := \left(1 + \frac{2}{3(12-1)}\right) \cdot (223907980.2);$

$gt := 2.374781608 \cdot 10^8$

>  $x := a - b;$

$x := -2.510862161 \cdot 10^8$

>

