

DAFTAR PUSTAKA

- Alrabaiah, H., Safi M. A., Darassi M. H., dkk. 2020. Optimal control analysis of hepatitis B virus with treatment and vaccination. Result in Physics.
- Boyce, W. E., 2012. Elementary Differential Equations 10th Edition. United States: John Wiley & Sons.
- Farida, Yeni, Andayani, T. M., Ratnasari, N., 2014. Analisis Penggunaan Obat pada Komplikasi Sirosis Hati, Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi, **Vol. 4(2)**, 77-84.
- Fred, B., & Carlos-Charez, C., 2000. Mathematical Models in Population Biology and Epidemiologi. New York: Springer.
- Hale, J. K. & Kocak, H., 1991. Dynamics and Bifurcations. New York: Springer Verlag.
- Herri, S. H. (2008). *Model Matematika Epidemiologi SIRV (Studi Kasus terhadap Bayi yang Imunisasi Campak di Kota Madya Surakarta tahun 2007)*. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Kasbawati, 2011. Analisis Numerik Model Epidemiologi SIR dengan Faktor Difusi. Jurnal Matematika, Statistika, dan Komputasi, **Vol. 7(2)**, 98-107.
- Kementrian Kesehatan RI, 2016. Sebagian besar kematian akibat hepatitis virus berhubungan dengan hepatitis B dan C kronis. <http://www.depkes.go.id/article/view/16042700001/sebagian-besar-kematian-akibat-hepatitis-virus-berhubungan-dengan-hepatitis-b-dan-c-kronis.html> [diakses pada tanggal 3 Desember 2021].
- Khan, M. A., Islam, S., dan Zaman, G., 2018. Media coverage campaign in Hepatitis B transmission model, Applied Mathematics and Computation, **Vol. 331**, 378 – 393.
- Khatun, M. S., Biswas, M. H. A., 2020. Optimal Control Strategies for Preventing Hepatitis B Infection and Reducing Chronic Liver Cirrhosis Incidence. Infectious Disease Modelling, **Vol. 5**, 91-110.
- Lenhart, S. & Workman, J. T., 2007. Optimal Control Applied to Biological Models. London: Taylor & Francis Group.
- Liang, P., Zu, J., Yin, J., Li, H., Gao, L., Cui, F., dkk., 2015. The independent impact of newborn hepatitis B vaccination on reducing VHB prevalence in China. 1992-2006: A mathematical model analysis, Journal of Theoretical Biology. **Vol. 386**, 115-121.
- Litbangkes. Riset Kesehatan Dasar, 2013. Jakarta: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.

- Liu, L., Jiang D., Hayat, T., Ahmad, B., 2018. Dynamics of a Hepatitis B Model with Saturated Incidence. *Acta Mathematica Scientia*, **Vol. 38B**, 1731-1750.
- Murray, J., 2002. *Mathematical Biology I: An Introduction*. Third Edition penyunt. Berlin Heidelberg: Springer.
- MachLachlan, Jennifer H., Cowie, Benjamin C., 2015. *Hepatitis B Virus Epidemiology*. Melbourne : Cold Spring Harbor Laboratory Press.
- Supu, N. A., Saltina, Palalu, K., Ismail, R. 2021. Model epidemi SICKR pada penyebaran penyakit hepatitis B dan kanker hati. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.
- Tri, W., Bayu, P., Nirmalasari, K., 2005. pemodelan matematika dan analisis stabilitas dari penularan penyakit gonore. *Buletin Ilmiah Mat. Stat. dan Terapannya (Bimaster)*, **Vol. 4(1)**, 47-56.
- Van den Driessche, P. A., 2002. Reproduction numbers and sub-threshold endemic equilibria for compartmental models of disease transmission. *mathematical Biosciences*.
- World Health Organization, 2019. Hepatitis in the Western Pasific. <https://www.who.int/westernpacific/health-topics/hepatitis>. [diakses pada tanggal 2 Desember 2021].
- World Health Organization, 2017. Hepatitis. <https://www.afro.who.int/health-topics/hepatitis>. [diakses pada tanggal 3 Desember 2021].
- Widowati, Sutimin, 2007. *Buku Ajar Pemodelan Matematika*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Wiggins, S., 1990. *Introduction to Applied Nonlinear Dynamical Systems and Chaos*. Second Edition penyunt. New York: Springer.
- Winarno, 2009. *Analisis Model Dinamika Virus dalam Sel*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Yang, J. D., Kim, W. R., Coelho, R., Mettler, T. A., Sanderson, S. O., dkk, 2011. Cirrhosis is Present in Most Patients with Hepatitis B and Hepatitis Patocellular Carcinoma. *Clinical Gastroenterology and Hepatology*, **Vol.9I**, 64-70.
- Zhang, J., Suxia, Z., 2018. Application and Optimal Control for an HBV Model with Vaccination and Treatment. *Hindawi*, **Vol.2018**, 1-13.

LAMPIRAN

Lampiran 1

```
clear all;
clc;
clf;
global a1 a2 a3 w1 w2 w3 lambda alpha eta1 eta2 miu beta omega
gamma phi rho teta epsilon delta tau qiu pii J

% Nilai parameter model
%lambda= 0.0121; miu=0.0096; alpha=0.01842; eta1=0.04;
eta2=0.05372; beta=0.036;
%gamma=0.003; omega=0.002; phi=0.0009; epsilon=0.02; rho=0.6;
teta=0.4; delta=0.03; tau=0.94; qiu=0.11;

lambda= 0.0096; miu=0.0096; alpha=0.01458; eta1=0.04;
eta2=0.05372; beta=0.036;
gamma=0.003; omega=0.002; phi=0.0009; epsilon=0.02; rho=0.6;
teta=0.4; delta=0.025; tau=0.94; qiu=0.11; pii=0.03;

%Nilai Bobot
a1=1; a2=50; a3=20; w1=1; w2=20; w3=20;
% Nilai awal state

x10=535.000;
x20=160.500;
x30=107.000;
x40=80.250;
x50=26.750;
x60=53.500;

x0=[x10;x20;x30;x40;x50;x60];
%Nilai akhir Costate (syarat transversalitas)
nx=6;
lambdaT=zeros(nx,1);
%Interval waktu
Ntime=500;
tf=50;
% tf=15;
ti=linspace(0,tf,Ntime);
%Batas kontrol
M1=0;
M2=1;
nv=3;
Lb=M1.*ones(nv,Ntime);
Ub=M2.*ones(nv,Ntime);
%Parameter Sweep
```

```

test=-1;
deltaa=0.000001;
k=0;
%tebakan awal untuk fungsi kontrol u1, u2 dan u3
u=0*ones(nv,Ntime);
%solving sistem tanpa kontrol (u1=0 u2=0 u3=0)
options = odeset('AbsTol',1e-3,'RelTol',1e-3);
xc=ode45(@(t,x) ika_state(t, x, u, ti),[0 tf],x0,options);
xc=deval(xc,ti);
%Awal Metode Sweep
x=zeros(nx,Ntime);
p=zeros(nx,Ntime);
while(test<0)
    k=k+1;
    oldx=x;
    oldp=p;
    oldu=u;
    %Forward Runge Kutta
    x=deval(ode45(@(t,x) ika_state(t, x, u, ti), [0 tf], x0),ti);
    %Backward Runge Kutta %yg digunakan nilai akhir lambdaT=0
    p=deval(ode45(@(t,p) ika_costate(t, p, x, u, ti),[tf
0],lambdaT),ti);
    %menghitung nilai u dari syarat optimal sistem
    u1=ika_kontrol(x,p); %menggunakan u dH/du=0
    %membuat u berada dalam interval yang diharapkan
    u1=ika_simplebounds(u1,Lb,Ub);
    %mengupdate nilai u dalam metode sweep menggunakan kombinasi
konveks
    u=0.5*(u1+oldu); %uji Konvergensi u yang pertama
    %menghitung nilai error
    temp1=deltaa*sum(abs(u))-sum(abs(oldu-u));
    temp2=deltaa*sum(abs(x))-sum(abs(oldx-x));
    temp3=deltaa*sum(abs(p))-sum(abs(oldp-p));
    test=min(temp1,min(temp2,temp3)); %Buku Lenhart Hal:55
    %menghitung nilai fungsi tujuan menggunakan u akhir

    J(k)=ika_objektif(x,u,ti);
    disp(['it:',num2str(k),' ,Test:',num2str(test)])
end
    %menghitung nilai fungsi tujuan menggunakan u optimal
    [m,n]=size(J);
    Ju=ika_objektif(x,u,ti);

XC1 = sum(xc(1,1:end-1)).*tf./Ntime;
disp (XC1)
XC2 = sum(xc(2,1:end-1)).*tf./Ntime;
disp (XC2)
XC3 = sum(xc(3,1:end-1)).*tf./Ntime;
disp (XC3)
XC4 = sum(xc(4,1:end-1)).*tf./Ntime;
disp (XC4)
XC5 = sum(xc(5,1:end-1)).*tf./Ntime;
disp (XC5)
XC6 = sum(xc(6,1:end-1)).*tf./Ntime;
disp (XC6)

```

```

XK1 = sum(x(1,1:end-1)).*tf./Ntime;
disp (XK1)
XK2 = sum(x(2,1:end-1)).*tf./Ntime;
disp (XK2)
XK3 = sum(x(3,1:end-1)).*tf./Ntime;
disp (XK3)
XK4 = sum(x(4,1:end-1)).*tf./Ntime;
disp (XK4)
XK5 = sum(x(5,1:end-1)).*tf./Ntime;
disp (XK5)
XK6 = sum(x(6,1:end-1)).*tf./Ntime;
disp (XK6)

%Jint=trapz(ti,J);
%menghitung nilai fungsi tujuan menggunakan u optimal
figure (1)
subplot (3,2,1)
plot(ti,xc(1,:), 'R--',ti, x(1,:), 'b-', 'LineWidth',2)
%plot(ti, x(1,:), 'black-', 'LineWidth',2)
xlabel('Waktu (Tahun)')
ylabel('S(t)')
legend('S Tanpa Kontrol', 'S dengan Kontrol')
axis('tight')
grid on
hold on

%,u_2(t),u_3(t)
subplot (3,2,2)
plot(ti,xc(2,:), 'R--',ti, x(2,:), 'b-', 'LineWidth',2)
%plot(ti, x(2,:), 'black-', 'LineWidth',2)
xlabel('Waktu (Tahun)')
ylabel('E(t)')
legend('E Tanpa Kontrol', 'E dengan Kontrol')
axis('tight')
grid on
hold on

subplot (3,2,3)
plot(ti,xc(3,:), 'R--',ti, x(3,:), 'b-', 'LineWidth',2)
%plot(ti, x(3,:), 'black-', 'LineWidth',2)
xlabel('Waktu (Tahun)')
ylabel('A(t)')
legend('A Tanpa Kontrol', 'A dengan Kontrol')
axis('tight')
grid on
hold on

subplot (3,2,4)
plot(ti,xc(4,:), 'R--',ti, x(4,:), 'b-', 'LineWidth',2)
% plot(ti, x(4,:), 'black-', 'LineWidth',2)
xlabel('Waktu (Tahun)')
ylabel('C(t)')

```

```

legend('C Tanpa Kontrol','C dengan Kontrol')
axis('tight')
grid on
hold on

subplot (3,2,5)
plot(ti,xc(5,:), 'R--',ti, x(5,:), 'b-', 'LineWidth',2)
% plot(ti, x(5,:), 'black-', 'LineWidth',2)
xlabel('Waktu (Tahun)')
ylabel('L(t)')
legend('L Tanpa Kontrol','L dengan Kontrol')
axis('tight')
grid on
hold on

subplot (3,2,6)
plot(ti,xc(6,:), 'R--',ti, x(6,:), 'b-', 'LineWidth',2)
%plot(ti, x(6,:), 'black-', 'LineWidth',2)
xlabel('Waktu (Tahun)')
ylabel('R(t)')
legend('R Tanpa Kontrol','R dengan Kontrol')
axis('tight')
grid on
hold on

figure (2)
subplot(221)
plot(ti,u(1,:), 'b-',ti,u(2,:), 'g-',ti,u(3,:), 'r-', 'LineWidth',2)
legend('kontrol u_1 (Vaksinasi)', 'kontrol u_2 (Kampanye)', 'kontrol
u_3 (Pengobatan)')
xlabel('Waktu ')
ylabel('u_1(t), u_2(t), u_3(t)')
title('Fungsi Kontrol')
axis('tight')
grid on

subplot(222)
plot(ti,u(2,:), 'g-', 'LineWidth',2)
legend('kontrol u_2 (Kampanye)')
xlabel('Waktu ')
ylabel('u_2(t)')
title('Fungsi Kontrol')
axis('tight')
grid on

subplot(223)
plot(ti,u(3,:), 'r-', 'LineWidth',2)
legend('kontrol u_3 (Pengobatan)')
xlabel('Waktu ')
ylabel('u_3(t)')
title('Fungsi Kontrol')
axis('tight')

```

```

grid on

subplot(224)
plot(ti,u(1,:), 'b-', 'LineWidth', 2)
legend('kontrol u_1 (Vaksinasi)')
xlabel('Waktu ')
ylabel('u_1(t)')
title('Fungsi Kontrol')
axis('tight')
grid on

function J=ika_objektif(x,u,ti)
global a1 a2 a3 w1 w2 w3
x2=x(2,:);
x3=x(3,:);
x4=x(4,:);
x5=x(5,:);
x6=x(6,:);
u1=u(1,:);
u2=u(2,:);
u3=u(3,:);
obj=a1.*x3+a2.*x4+a3.*x5+(w1./2).*u1.^2 +(w2./2).*u2.^2
+(w3./2).*u3.^2;
J=trapz(ti,obj);

function u = ika_kontrol(x,p)
global w1 w2 w3 qiu lambda tau
%theta

p1 = p(1,:);
p2 = p(2,:);
p3 = p(3,:);
p4 = p(4,:);
p5 = p(5,:);
p6 = p(6,:);

x1 = x(1,:);
x2 = x(2,:);
x3 = x(3,:);
x4 = x(4,:);
x5 = x(5,:);
x6 = x(6,:);

%fungsi kontrol:
u1=(lambda.*tau.*((1-qiu.*x4).*p1)+(qiu.*x4.*p4)+p1-p6)./w1;
u2=((p3-p6).*x3)+((p4-p6).*x4))./w2;
u3=((p5-p6).*x5)./w3;

u=[u1;u2;u3];
end

```

```

function dx=ika_state(t, x, u, ti) %ti adalah inputan %t,x,u
adalah variabel
global lambda alpha eta1 eta2 miu beta omega gamma phi rho
epsilon delta teta tau qiu pii
x1=x(1);
x2=x(2);
x3=x(3);
x4=x(4);
x5=x(5);
x6=x(6);
u1=u(1,:);
u1=interp1(ti,u1',t);
u2=u(2,:);
u2=interp1(ti,u2',t);
u3=u(3,:);
u3=interp1(ti,u3',t);

dx=zeros(6,1);

dx(1)=(lambda.*(1-(u1.*tau).*(1-qiu.*x4)))-
(alpha.*(x3+(eta1.*x4)+(eta2.*x5)).*x1)-(miu+u1).*x1;
dx(2)=(alpha.*(x3+(eta1.*x4)+(eta2.*x5)).*x1)-(beta+miu).*x2;
dx(3)=(beta.*x2)-(omega+gamma+miu+u2).*x3;
dx(4)=(omega.*x3)-(phi+miu+delta+u2).*x4+(lambda.*(1-
(u1.*tau)).*qiu.*x4);
dx(5)=(phi.*x4)+(teta.*delta.*x4)+(rho.*gamma.*x3)-
(miu+epsilon+pii+u3).*x5;
dx(6)=( (1-rho).*gamma.*x3)+( (1-teta).*delta.*x4)-
(miu.*x6)+(pii.*x5)+(lambda.*tau.*u1)+(u1.*x1)+(u2.*x3)+(u2.*x4)+(
u3.*x5);
end

```

```

function dp=ika_costate(t, p, x, u, ti)
global a1 a2 a3 w1 w2 w3 lambda alpha eta1 eta2 miu beta omega
gamma phi rho teta epsilon delta tau qiu pii
%theta
x = interp1(ti,x',t);

x1 = x(1);
x2 = x(2);
x3 = x(3);
x4 = x(4);
x5 = x(5);
x6 = x(6);
u1 = u(1,:);
u2 = u(2,:);
u3 = u(3,:);
u1 = interp1(ti,u1',t);
u2 = interp1(ti,u2',t);
u3 = interp1(ti,u3',t);

```



```

p1=p(1,:);
p2=p(2,:);
p3=p(3,:);
p4=p(4,:);
p5=p(5,:);
p6=p(6,:);
dp=zeros(6,1);
dp(1)=(p1-p2).*(alpha.*(x3+(eta1.*x4)+(eta2.*x5)))+(p1.*miu);
dp(2)=(p2-p3).*beta)+(p2.*miu);
dp(3)=(p1-p2).*alpha.*x1)+(p3-p6).*u2)+(p6-
p5).*rho.*gamma)+(p3-p6).*gamma)+(p3-p4.*omega)+(p3.*miu)-a1;
dp(4)=(p1-p2).*alpha.*eta1.*x1)+(p4-
p1).*lambda.*qiu.*tau.*u1)+(p1-p4).*lambda.*qiu)+(p4-
p6).*u2)+(p4-p6).*delta)+(p4-p5).*phi)+(p6-
p5).*teta.*delta)+(p4.*miu)-a2;
dp(5)=(p1-p2).*alpha.*eta2.*x1)+(p5-p6).*u3)+(p5-
p6).*pii)+(p5.*(miu+epsilon))-a3;
dp(6)=(p6.*miu);
end

```

```

function s=ika_simplebounds(s,Lb,Ub)

```

```

% untuk batas bawah
ns_tmp=s;
I=ns_tmp<Lb;
ns_tmp(I)=Lb(I);

% untuk batas atas
J=ns_tmp>Ub;
ns_tmp(J)=Ub(J);

% Update u
s=ns_tmp;

```