**GAMBARAN HISTOPATOLOGI JANTUNG ITIK
PEKING (*Anas platyrhynchos domestica*) PASCA
PEMBERIAN PAKAN FORMULASI PROBIOTIK**

Lactobacillus sp.* DAN *Bacillus subtilis

HISTOPATHOLOGICAL OVERVIEW OF THE PEKING
DUCK HEART (*Anas platyrhynchos domestica*) AFTER
FEEDING THE PROBIOTIC FORMULATION FEED
Lactobacillus sp. AND *Bacillus subtilis*

FREDI NOVIANTO PAERUNAN

C031 20 1004

PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

GAMBARAN HISTOPATOLOGI JANTUNG ITIK PEKING (*Anas platyrhynchos domestica*) PASCA PEMBERIAN PAKAN FORMULASI PROBIOTIK *Lactobacillus sp.* DAN *Bacillus subtilis*

HISTOPATHOLOGICAL OVERVIEW OF THE PEKING DUCK HEART (*Anas platyrhynchos domestica*) AFTER FEEDING THE PROBIOTIC FORMULATION FEED *Lactobacillus sp.* AND *Bacillus subtilis*

SKRIPSI

untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana

FREDI NOVIANTO PAERUNAN

C031 20 1004

PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

GAMBARAN HISTOPATOLOGI JANTUNG ITIK PEKING (*Anas platyrhynchos domestica*) PASCA PEMBERIAN PAKAN FORMULASI PROBIOTIK *Lactobacillus sp.* DAN *Bacillus subtilis*

FREDI NOVIANTO PAERUNAN

C031 20 1004

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Drh. NURUL SULFI ANDINI, M.Sc
NIDK. 8929300020

Drh. Rasdiyanah, M.Si
NIP. 19880313 2018016001

Pada tanggal 21...Maret....2024

SKRIPSI

GAMBARAN HISTOPATOLOGI JANTUNG ITIK PEKING (*Anas platyrhynchos domestica*) PASCA PEMBERIAN PAKAN FORMULASI PROBIOTIK *Lactobacillus sp.* DAN *Bacillus subtilis*

HISTOPATHOLOGICAL OVERVIEW OF THE PEKING DUCK HEART (*Anas platyrhynchos domestica*) AFTER FEEDING THE PROBIOTIC FORMULATION FEED *Lactobacillus sp.* AND *Bacillus subtilis*

Disusun dan diajukan oleh :

FREDI NOVIANTO PAERUNAN
C031 20 1004

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi Prodi Kedokteran Hewan, Fakultas Kedokteran, Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 21 Maret 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Panitia Penguji Skripsi

1. Ketua : drh. Nurul Sulfi Andini, M.Sc
2. Sekretaris : drh. Rasdyanah, M.Si
3. Anggota : Andi Ninnong Renita Relatami, S.Pi, M.Si
4. Anggota : Abdul Wahid Jamaluddin, S.Farm. Apt., MSI.
5. Panitia : Dr. drh. Fika Yuliza Purba, M.Sc

Mengetahui, Ketua Program Studi Kedokteran Hewan
Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin

Dr. drh. Dwi Kesuma Sari, AP.Vet
NIP. 19730216 199903 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar adalah hasil karya saya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh dibatalkan dan dikenakan sanksi akademik yang berlaku. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Makassar 18 Maret 2024

Yang menyatakan

Fredi Novianto Paerunan
C031 20 01004

Optimized using
trial version
www.balesio.com

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena berkat dan anugerah-Nya yang melimpah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Gambaran Histopatologi Jantung Itik Peking (*Anas platyrhynchos domestica*) Pasca Pemberian Pakan Formulasi Probiotik *Lactobacillus sp.* dan *Bacillus subtilis*” sebagai salah satu syarat mengerjakan skripsi pada program pendidikan strata satu Program Studi Kedokteran Hewan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari kedua orang tua saya tercinta mama Yosepita dan bapak Yosep Paerunan serta saudara saya drh. Gregorius Wahyudi yang selalu ada setiap saat dari kecil hingga dewasa, memberikan dukungan serta doa kepada penulis. Kepada segenap keluarga saya atas doa dan dukungan yang tiada hentinya, serta berbagai pihak yang telah membantu selama proses penulisan dan penelitian. Oleh karena itu, penulis merasa sangat bersyukur dan ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. dr. Haerani Rasyid, SpPD-KGH, SpGK selaku Dekan Fakultas Kedokteran, Universitas Hasanuddin.

- r. drh. Dwi Kesuma Sari, AP.Vet selaku Ketua Program Studi Kedokteran Hewan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.

4. drh. Nurul Sulfi Andini, M.Sc. dan drh. Rasdyanah M.Si. selaku pembimbing atas waktu, bimbingan, arahan, serta masukan selama penyusunan skripsi hingga selesainya skripsi ini.
5. Bapak Abdul Wahid Jamaluddin, S.Farm., Apt., M.Si. dan Ibu Andi Ninnong Renita Relatami, S.Pi, M.Si sebagai dosen penguji seminar proposal dan seminar hasil yang telah memberikan masukan-masukan dan penjelasan untuk perbaikan penulisan skripsi ini.
6. drh. Baso Yusuf, M.Sc. selaku penasehat akademik penulis selama menempuh pendidikan pada Program Studi Kedokteran Hewan.
7. Segenap panitia seminar proposal dan seminar hasil atas segala bantuan dan kemudahan yang diberikan kepada penulis.
8. Staf pengajar dan staf administrasi yang telah banyak membantu dan bimbingan selama penulis menempuh pendidikan pada Program Studi Kedokteran Hewan.
9. PT. Pertamina Patra Niaga DPPU Hasanuddin yang telah menjadi sponsor penelitian ini hingga selesai.
10. Kepada teman-teman seperjuangan CIONE yang telah membantu dalam memberikan saran dan masukan selama pengerjaan skripsi.
11. Kepada teman penelitian DEXLITE (Duck Ex Kolesterol) Shaffati Shaffa, Fatoni Awal Romadhan, Annisa, Andi Nurabrar Triwinarsih dan Daud Alkindy senantiasa membantu dalam penelitian ini.

epada saudara RSN A-115 yang sudah menjadi tempat berkeluh
asah bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

13. Spesial terimakasih untuk Seseorang yang selalu ada membimbing, menemani dan menjadi pendengar segala keluh kesah penulis selama perkuliahan, penelitian sampai skripsi ini selesai

14. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu yang telah memberikan bantuan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya. Sehingga akhirnya proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut.

Makassar, 18 Maret 2024

Fredi Novianto Paerunan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

FREDI NOVIANTO PAERUNAN. Gambaran Histopatologi Jantung Itik Peking (*Anas platyrhynchos domestica*) Pasca Pemberian Pakan Formulasi Probiotik *Lactobacillus sp.* Dan *Bacillus subtilis* (dibimbing oleh Nurul Sulfi Andini dan Rasdiyanah).

Ternak itik merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan masyarakat akan pangan yang bergizi. Namun karakteristik daging itik yang memiliki kadar lemak dan kolesterol yang tinggi, menimbulkan keresahan pada masyarakat dalam mengonsumsi daging itik. Salah satu upaya menurunkan lemak dan kolesterol pada itik adalah dengan penambahan probiotik pada pakan itik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penambahan probiotik *Lactobacillus sp.* dan *Bacillus subtilis* pada pakan terhadap gambaran histopatologi lemak jantung itik peking (*Anas platyrhynchos domestica*). Penelitian ini menggunakan metode eksperimental laboratorium dengan total sampel 24 ekor itik peking (*Anas platyrhynchos domestica*) yang terdiri dari P0 berupa kelompok kontrol negatif dan P1, P2, serta P3 merupakan kelompok perlakuan yang terdiri dari P1 yakni penambahan *Lactobacillus sp.*, P2 yakni penambahan *Bacillus subtilis*, dan P3 yakni penambahan kombinasi *Lactobacillus sp.* dan *Bacillus subtilis*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok perlakuan P3 mengalami perbaikan perlemakan yang lebih baik daripada kelompok P0, P1 dan P2 yang ditandai dengan berkurangnya infiltrasi lemak pada jaringan miokardium jantung. Kesimpulan bahwa penambahan probiotik *Lactobacillus sp.* dan *Bacillus subtilis* mampu menurunkan perlemakan jaringan miokardium jantung yang diamati melalui gambaran histopatologi jantung itik peking (*Anas platyrhynchos domestica*).

Kata kunci: Itik, Jantung, Lemak

ABSTRACT

FREDI NOVIANTO PAERUNAN. Histopathological Overview Of The Peking Duck Heart (*Anas Platyrhynchos Domestica*) After Feeding The Probiotic Formulation Feed *Lactobacillus Sp.* And *Bacillus subtilis* (led by Nurul Sulfi Andini and Rasdiyanah).

Duck farming is one alternative that can be used to support the community's need for nutritious food. However, the characteristics of duck meat which have high levels of fat and cholesterol, cause unrest in the community in consuming duck meat. One of the efforts to reduce fat and cholesterol in ducks is by adding probiotics to duck feed. The purpose of this study was to determine the effect of the addition of probiotics *Lactobacillus sp.* and *Bacillus subtilis* in feed on the histopathology of heart of Peking ducks (*Anas platyrhynchos domestica*). This study used an laboratory experimental method with a total sample of 24 Peking ducks (*Anas platyrhynchos domestica*) consisting of P0 as a negative control group and P1, P2, and P3 are treatment groups consisting of P1, namely the addition of *Lactobacillus sp.*, P2, namely the addition of *Bacillus subtilis*, and P3, namely the addition of a combination of *Lactobacillus sp.* and *Bacillus subtilis*. The results of this study showed that the P3 treatment group experienced better fatty improvement than the P0, P1 and P2 groups characterized by reduced fatty infiltration in the heart myocardium tissue. The conclusion is that the addition of probiotics *Lactobacillus sp.* and *Bacillus subtilis* is able to reduce fatty heart myocardium tissue observed through the histopathological picture of the peking duck heart (*Anas platyrhynchos domestica*).

Keywords: Duck, Fat, Heart

DAFTAR ISI

	halaman
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Rumusan Masalah.....	3
I.3 Tujuan Penelitian.....	3
I.3.1 Tujuan Umum.....	3
I.3.2 Tujuan Khusus.....	4
I.4 Manfaat Penelitian.....	4
I.4.1 Manfaat Pengembangan Ilmu.....	4
I.4.2 Manfaat Aplikasi.....	4
I.5 Hipotesis.....	4
I.6 Keaslian Penelitian.....	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
ik Peking (<i>Anas platyrhynchos domestica</i>).....	6
robotik.....	7
efinisi Probiotik.....	7

II.2.2	Bakteri Asam Laktat Sebagai Probiotik	8
II.2.3	<i>Bacillus Subtilis</i>	9
II.2.4	<i>Lactobacillus Sp</i>	10
II.3	Jantung	10
II.3.1	Anatomi Dan Fisiologi Jantung	10
II.3.2	Histologi Jantung	12
II.3.3	Perlemakan Jantung.....	13
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN		15
III.1	Waktu Dan Tempat Penelitian	15
III.2	Jenis Penelitian.....	15
III.3	Metode Penelitian	15
III.3.1	Alat.....	15
III.3.2	Bahan.....	16
III.4	Prosedur Penelitian.....	16
III.4.1	Persiapan Sampel.....	16
III.4.2	Aklimatisasi Hewan Coba	17
III.4.3	Pembuatan Pakan Probiotik	17
III.4.4	Perlakuan Hewan Uji	18
III.4.5	Pembuatan Preparat Histologi.....	19
III.4.6	Pengamatan Preparat Histopatologi Jantung	21
III.5	Analisis Data	21
	lur Penelitian.....	22
HASIL DAN PEMBAHASAN		23

IV.1 Hasil.....	23
IV.2 Pembahasan	25
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	29
V.1 Kesimpulan.....	29
V.2 Saran.....	29
DAFTAR PUSTAKA.....	30
LAMPIRAN.....	34

Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR GAMBAR

Gambar	halaman
1. Itik peking.....	6
2. Jantung unggas	11
3. Histologi jantung unggas	12
4. Alur penelitian	22
5. Histopatologi perlemakan jantung	24

Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	halaman
1. Kandang kelompok perlakuan	34
2. Pengenceran probiotik.....	34
3. Proses pembuatan pakan probiotik	35
4. Pemberian pakan.....	35
5. Pengambilan sampel	35
6. Pembuatan preparat histologi	36
7. Pengamatan preparat histologi.....	36

BAB I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Ternak itik merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan masyarakat akan pangan yang bergizi. Terdapat berbagai jenis itik lokal di Indonesia, lebih dikenal dengan nama tambahan daerah tempat pengembangannya, misalnya itik tegal, itik mojosari, itik magelang, itik pengging, dan itik rambon. Beberapa jenis itik lokal tersebut bisa ditenakkan sebagai itik pedaging (Andoko & Sartono, 2013). Potensi ternak itik di Indonesia sangat besar terutama sebagai pengasil daging dan telur (Dapawole & Sudarma, 2020). Produksi itik di Indonesia semakin meningkat setiap tahun, hal ini dapat dilihat dari tahun 2019 mencapai 4.656.338 ton, tahun 2020 produksi daging mencapai 4.111.623 ton, pada tahun 2021 produksi daging mencapai 4.419.805 ton (BPS, 2021).

Hasil produksi utama dari ternak itik adalah telur dan daging. Daging merupakan salah satu hasil ternak yang hampir tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dan merupakan bahan pangan yang sangat bermanfaat bagi manusia karena mengandung nutrien yang cukup tinggi, asam-asam aminonya lengkap dan esensial untuk proses pertumbuhan dan perkembangan jaringan tubuh. Karakteristik daging itik yaitu dagingnya
ju kenyal, berbau amis dan berlemak tinggi (Putra dkk. 2016).
i penyakit seperti aterosklerosis hingga jantung koroner dapat

terjadi apabila akumulasi kadar lemak pada tubuh itik tinggi (Meidayanti, 2021).

Tingginya kadar lemak pada tubuh hewan dapat ditunjukkan melalui pemeriksaan histopatologi dimana akumulasi abnormal lemak pada sel dapat mengakibatkan toksisitas sel atau yang lebih dikenal lipotoksitas. Lemak menembus membran sel melalui transporter *fatty acid transport* protein. Kerusakan sel tersebut menyebabkan terjadinya infiltrasi lemak, sel lemak menembus membran sel dan terjadi akumulasi sel-sel lemak intraseluler yaitu di antara sel parenkim suatu organ, salah satunya sel otot jantung (Aisyah dkk. 2014). Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya probiotik dianggap dapat menurunkan kadar lemak dalam tubuh dalam hal tersebut probiotik dapat digunakan sebagai tambahan pakan pada itik (Putra dkk. 2016).

Probiotik merupakan organisme hidup yang bila dikonsumsi dapat meningkatkan kesehatan manusia atau ternak dengan cara menyeimbangkan mikroflora dalam saluran pencernaan (Sumardi dkk. 2016). Salah satu jenis bahan yang dapat digunakan sebagai probiotik yaitu bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat mampu memproduksi enzim *Bile Salt Hydrolase* (BSH) yaitu enzim yang dapat mendekongjugasi garam empedu yang akan dikeluarkan melalui feses sehingga jumlah asam empedu yang kembali ke hati menjadi berkurang (Dwiputra dkk. 2020).

menyeimbangkan konsentrasi garam empedu, maka tubuh akan
ambil kolesterol darah sebagai bahan prekursornya. Proses ini pada

akhirnya akan menurunkan kadar kolesterol darah secara keseluruhan (Adib, 2015). Probiotik dapat diberikan secara oral pada hewan dalam bentuk tablet, cairan, atau pasta (Sumardi dkk. 2016).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian bakteri *Lactobacillus sp.* dan *Bacillus subtilis* sebagai sumber probiotik terhadap gambaran histopatologi jantung itik peking (*Anas platyrhynchos domestica*). Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau data ilmiah untuk penelitian lebih lanjut. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas produksi dan tingkat konsumsi itik peking (*Anas platyrhynchos domestica*).

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat diambil rumusan masalah bagaimanakah pengaruh penambahan probiotik *Lactobacillus sp* dan *Bacillus subtilis* pada pakan itik peking (*Anas platyrhynchos domestica*) yang diamati melalui gambaran histopatologi jantung.

I.3 Tujuan Penelitian

I.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan probiotik *Lactobacillus sp* dan *Bacillus subtilis* pada pakan itik peking (*Anas platyrhynchos domestica*) yang diamati melalui gambaran histopatologi

I.3.2 Tujuan Khusus

Mengidentifikasi adanya perlemakan pada jantung berdasarkan gambaran histopatologi jantung itik peking (*Anas platyrhynchos domestica*), sebelum penambahan probiotik *Lactobacillus sp.* dan *Bacillus subtilis* pada pakan.

I.4 Manfaat Penelitian

I.4.1 Manfaat Pengembangan Ilmu

Manfaat pengembangan ilmu pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan probiotik *Lactobacillus sp.* dan *Bacillus subtilis* pada pakan itik terhadap gambaran perlemakan jantung yang diamati melalui gambaran histopatologi jantung itik peking (*Anas platyrhynchos domestica*).

I.4.2 Manfaat Aplikasi

Manfaat aplikasi pada penelitian ini adalah untuk mengembangkan manfaat probiotik terhadap penurunan kadar lemak itik dilihat dari gambaran histopatologi jantung itik peking.

I.5 Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil hipotesis penelitian bahwa Penambahan probiotik *Lactobacillus sp* dan *Bacillus subtilis* pada pakan itik pedaging dapat mempengaruhi perlemakan jantung, yang diamati melalui gambaran histopatologi jantung.

I.6 Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai pengaruh penambahan probiotik terhadap gambaran histologi organ telah dilakukan sebelumnya dengan judul “Pengaruh Penambahan Probiotik *Lactobacillus Sp.* Dan *Bacillus Subtilis* Pada Pakan Terhadap Gambaran Histologi Lemak Hepar Dan Otot Paha Itik Peking (*Anas Platyrhynchos Domestica*)” (Shaffa, 2018). Namun, penelitian mengenai pengaruh probiotik terhadap organ jantung khususnya gambaran histopatologi organ jantung itik peking, belum pernah dilakukan sebelumnya.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Itik Peking (*Anas platyrhynchos domestica*)

Itik adalah salah satu jenis unggas air yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan unggas yang lain. Kelebihan tersebut diantaranya adalah tingkat pertumbuhannya lebih cepat dari ayam dan mempunyai kemampuan mencerna serat kasar yang tinggi. Daging itik merupakan salah satu komoditi unggulan karena mengandung zat gizi seperti protein, lemak, dan zat gizi lain yang tinggi dibanding ayam (Yulianti dkk. 2013). Menurut Megumi (2021), taksonomi itik adalah sebagai berikut.

Kerajaan : *Animalia*
Filum : *Chordata*
Kelas : *Aves*
Ordo : *Anseriformes*
Family : *Anatidae*
Genus : *Anas*

. Itik peking (*Anas platyrhynchos domestica*) dengan paruh kuning dan bulu putih t minyak (Dokumentasi Pribadi).

Itik peking merupakan ternak unggas penghasil daging yang sangat potensial di samping ayam. Kelebihan ternak ini adalah lebih tahan terhadap penyakit dibandingkan dengan ayam ras sehingga pemeliharaannya mudah dan tidak banyak mengandung resiko. Daging itik merupakan sumber protein yang bermutu tinggi dan itik mampu berproduksi dengan baik, oleh karena itu pengembangannya diarahkan kepada produksi yang cepat dan tinggi sehingga mampu memenuhi permintaan konsumen (Ambarsari, 2016).

II.2 Probiotik

II.2.1 Definisi Probiotik

Menurut *Food and Agriculture Organization (FAO)* dan *World Health Organization (WHO)* probiotik adalah mikroorganisme yang hidup dalam tubuh host dengan jumlah yang memadai yang akan memberikan manfaat kesehatan pada *host*. Mekanisme probiotik misalnya, memiliki dampak pada mikrobiota usus atau meningkatkan fungsi kekebalan tubuh (Hill dkk. 2014). Kriteria mikroorganisme probiotik yang telah ditetapkan oleh FAO antara lain harus teridentifikasi fenotipe dan genotipe, mampu bertahan hidup pada kondisi asam lambung dan garam empedu pencernaan, memberi keuntungan pada usus, mampu menempel pada mukus dan atau sel epitel usus, menghasilkan aktivitas antimikroba terhadap bakteri patogen, merupakan mikroorganisme yang aman atau termasuk

organisme GRAS (*Generally Recognized as Safe*), tidak
silkan toksin, tidak bersifat resisten terhadap antibiotik, dan bukan

bakteri patogen (Chotiah & Rini, 2018). Kriteria lainnya yang perlu dimiliki oleh bakteri probiotik adalah mampu menghasilkan substansi antimikrobal sehingga mampu menekan pertumbuhan bakteri patogen enterik. Berbagai jenis substansi antimikrobia yang dihasilkan oleh bakteri probiotik adalah asam organik, hidrogen peroksida, diasetil, dan diperkirakan juga bakteriosin yaitu protein atau polipeptida yang memiliki sifat anti bakteri (Sunaryanto dkk. 2014).

II.2.2 Bakteri Asam Laktat Sebagai Probiotik

Bakteri asam laktat (BAL) merupakan bakteri anaerob fakultatif yang mampu hidup pada habitat yang cukup luas, seperti saluran pencernaan hewan dan manusia (Chotiah & Rini, 2018). BAL merupakan organisme menguntungkan karena dapat memfermentasi molekul karbohidrat untuk menghasilkan asam laktat. Karakteristik BAL bereaksi pada pewarnaan gram dan akan negatif bereaksi terhadap katalase. Beberapa BAL bersifat antimikroba. Spesies lain BAL mampu memproduksi enzim BSH (*Bile Salt Hidrolase*) yang berfungsi mendegradasi lemak jenuh menjadi lemak tak jenuh, sehingga produk ternak yang dihasilkan akan bebas kolesterol (Aini dkk. 2021).

Bakteri Asam Laktat (BAL) selama ini sudah banyak digunakan sebagai probiotik. Bakteri asam laktat (BAL) telah lama dikenal sebagai kelompok bakteri yang menguntungkan. Pemanfaatannya sangat luas baik

angan maupun pakan. Bakteri Asam Laktat terdiri dari genus *Lactillus*, *Lactococcus*, *Leuconostoc*, *Streptococcus*, *Enterococcus*,

Pediococcus, *Melissococcus*, *Carnobacterium*, *Oenococcus*, *Tetragenococcus*, *Vagococcus* dan *Weissella* yang memiliki morfologi, pH, suhu optimum, toleransi garam, habitat serta potensi patogenitas yang berbeda. Pemilihan bakteri asam laktat sebagai probiotik sangat berkaitan dengan sifatnya yang memenuhi kriteria aman untuk dikonsumsi *generally recognized as safe* (GRAS), dimana hal ini merupakan syarat utama untuk probiotik dan kemampuannya untuk menghasilkan zat yang dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme lain. Probiotik didefinisikan sebagai mikroorganisme hidup, jika konsumsi dalam jumlah tertentu, memberikan manfaat kesehatan di samping nutrisi dasar lainnya (Wardinal dkk. 2019).

II.2.3 *Bacillus subtilis*

Bacillus subtilis adalah salah satu bakteri strain *Bacillus*, yang termasuk bakteri gram positif, berbentuk batang, membentuk spora, aerob/anaerob fakultatif. Strain *Bacillus* telah diakui sebagai bagian dari flora normal dan memiliki efek probiotik. *Bacillus* spp. memiliki beberapa karakteristik yang membuatnya cocok untuk penggunaan probiotik termasuk tingkat ketahanan yang tinggi terhadap pengeringan dan panas, serta stabilitas pada rentang pH yang luas. *Bacillus subtilis* dapat ditemukan sendiri atau dalam kombinasi dengan probiotik lain dalam berbagai formulasi yang tersedia secara komersial. Diperkirakan probiotik

dung kombinasi dua atau lebih pembentuk spora Basil spesies

dapat meningkatkan efek pengobatan versus yang mengandung strain tunggal (Marzorati dkk. 2020).

II.2.4 *Lactobacillus sp.*

Salah satu probiotik yang paling banyak digunakan adalah mikroorganisme dari genus *Lactobacillus*, yang mengandung lebih dari 200 spesies bakteri *Lactobacillus spp.* *Lactobacillus sp.* adalah bakteri gram positif, bakteri anaerob fakultatif yang memfermentasi karbohidrat untuk menghasilkan asam laktat (Du dkk. 2022). *Lactobacillus* merupakan jenis bakteri dengan genus terbesar dalam kelompok BAL (memiliki hampir 106 spesies) dengan sekitar 60 spesies berpotensi probiotik. *Lactobacillus* bertindak sebagai agen probiotik dan flora normal sehingga dapat berperan untuk membatasi pertumbuhan bakteri patogen. *Lactobacillus* juga berfungsi untuk menjaga sistem imun atau kekebalan tubuh. Hal ini disebabkan oleh kemampuan *Lactobacillus* dalam menghambat pertumbuhan bakteri patogen, merangsang pembentukan antibodi, selain itu genus *Lactobacillus* banyak digunakan untuk fermentasi dan pengawet makanan (Aini dkk. 2021).

II.3 Jantung

II.3.1 Anatomi dan Fisiologi Jantung

Jantung berperan dalam sistem sirkulasi untuk memberikan nutrisi dan oksigen ke berbagai bagian tubuh, melalui darah, yang beredar melalui

di darah dan arteri. Arteri membawa darah beroksigen dari jantung ke jaringan, sedangkan vena mengembalikan darah mengurangi

oksigen dari sel dan jaringan ke jantung (Purnamasari & Dwi, 2017). Jantung pada unggas berfungsi untuk mendistribusikan darah ke dalam paru-paru untuk menggantikan oksigen dan karbondioksida dalam menyokong proses metabolisme tubuh (Kusmayadi dkk. 2019). Proses metabolisme pada unggas terjadi setelah pakan masuk. Proses metabolisme ini akan mempengaruhi aktivitas kerja, ampela, hati, dan jantung. Unggas akan meningkatkan kemampuan metabolismenya untuk mencerna serat kasar sehingga meningkatkan ukuran ampela, hati, dan jantung (Putri, 2021).

Gambar 2 . Jantung unggas dengan atrium dan ventrikel *dexter* terbuka (König dkk. 2016).

Jantung unggas memiliki empat bilik yang terletak di bagian cranial rongga *thoraco-abdominal* dan sangat mirip dengan jantung mamalia, sebagian dikelilingi oleh hati di kedua sisinya (**Gambar 2**). Dibandingkan dengan ukuran tubuh, unggas memiliki jantung yang lebih besar daripada mamalia (König dkk. 2016). Persentase berat jantung unggas berkisar antara 0,5 – 1,42% dari bobot hidup (Kusmayadi dkk. 2019). Jantung memiliki septum yang memisahkan sisi kanan dan kiri jantung. Jantung dikelilingi oleh perikardium, dengan strukturnya yang mirip dengan

mamalia. Lapisan *pericardium* tersusun atas *peritoneum*, *pericardium fibrosum* dan *pericardium serosum parietale* (König dkk. 2016).

II.3.2 Histologi Jantung

Jantung adalah sebuah organ yang terdiri atas kumpulan otot (*muscular*) berongga yang berbentuk kerucut dan terdiri atas empat ruang yaitu ventrikel kanan dan ventrikel kiri serta atrium kanan dan atrium kiri (**Gambar 3**). Masing-masing bagian dari atrium menerima darah vena dan ventrikel yang memompakan darah dari jantung melalui arteri Ventrikel jantung unggas memiliki lebih banyak masa otot dan lebih sedikit ruang-ruang. Ventrikel kiri pada jantung unggas merupakan ruang jantung terbesar, yang didukung oleh otot jantung yang tebal untuk mengalirkan darah keseluruh tubuh, dan bekerja sangat keras pada saat burung mengepakkan sayap. Ventrikel kanan jantung hanya mengalirkan darah ke paru-paru dan resistansinya rendah, sehingga ukurannya lebih kecil (Putra dkk. 2022).

1. Histologi Jantung unggas dengan pemotongan melintang (Harash dkk. 2019). Struktur histologi pada jantung itik terdiri dari 3 lapisan yaitu epikardium, miokardium dan endokardium. Epikardium atau perikardium

merupakan struktur yang berupa kantung melapisi seluruh jantung kecuali bagian atrium kiri. Perikardium juga disebut membran yang membungkus dan melindungi jantung. Terdapat dua bagian perikardium, yaitu perikardium serosa dan perikardium fibrosa. Perikardium serosa lebih tipis dan lebih lembut dan membentuk dua lapisan mengelilingi jantung. Sedangkan perikardium fibrosa terdiri atas jaringan ikat yang kuat, padat, dan tidak elastis. Lapisan miokardium merupakan bagian yang tersusun oleh jaringan otot jantung. Lapisan miokardium membentuk dinding otot jantung dan bagian otot septum interventrikular. Lapisan endotel membentuk endokardium. Lapisan jaringan ikat subendokardium terdapat pada permukaan endokardium, ditemukan pembuluh darah kecil serta serat purkinje. Lapisan subendokardium melekat pada endomisium serat otot jantung (Putra dkk. 2022).

II.3.3 Perlemakan Jantung

Lipid atau lemak adalah kelompok senyawa heterogen yang berkaitan dengan asam lemak. Lipid oleh tubuh disimpan sebagai penghasil energi. Lipid yang diperoleh dari makanan akan diubah menjadi trigliserida, kolesterol dan lipoprotein untuk menjalankan fungsinya melalui proses metabolisme lemak (Siregar & Tri, 2020). Metabolisme lemak berbeda dengan metabolisme karbohidrat dan protein yang langsung dibawa ke dalam hepar, sedangkan lemak akan dibawa menuju jaringan adiposa dan

g mempunyai enzim lipoprotein lipase yang menghidrolisis lemak asam lemak bebas. Asam lemak bebas inilah yang diangkut

menuju hepar untuk dimetabolisme. Asam lemak bebas bisa mengalami esterifikasi menjadi triasilgliserol baik pada hepar, jaringan adiposa maupun otot. Asupan lemak yang berlebihan mengakibatkan akumulasi dari triasilgliserol tersebut pada otot, salah satunya adalah otot jantung. Akumulasi triasilgliserol pada hepar, diangkut oleh VLDL ke dalam aliran darah kemudian menuju ke jaringan perifer atau otot yang mempunyai enzim lipoprotein lipase sehingga semakin banyak akumulasi lemak pada sel otot jantung. Keadaan ini disebut perlemakan otot jantung (Aisyah dkk, 2014).

Optimized using
trial version
www.balesio.com